

CATALOGUE


D E S

ARBRES ET PLANTES

ETRANGERES,

ET AUSSI DES OIGNONS A FLEURS

QUI SE TROUVENT CHEZ



*Willem van
Hare
à Leyde*

EXPLICATION

*Des Lettres & marques de la Premiere Colonne
Regardant leur habitude.*

A. Signifie, Arbres
 R. - - - Arbrisseaux.
 V. - - - Plantes grimpantes.
 P. - - - Plantes.
 B. - - - Oignons.
 R. - - - R. qui perdent toute leur verdure en Hyver.
Racines

Les marques du zodiacq signifient environ le tems dans le quel ils fleurissent.

Comme	≡	Fait Connoitre qu'ils fleurissent, en				
			-	-	-	- Janvier.
χ	-	-	-	-	-	- Fevrier.
ν	-	-	-	-	-	- Mars.
♈	-	-	-	-	-	- Avril.
♊	-	-	-	-	-	- May.
♋	-	-	-	-	-	- Juin.
♌	-	-	-	-	-	- Juillet.
♍	-	-	-	-	-	- Aout.
♎	-	-	-	-	~	- Septemb.
♏	-	-	-	-	-	- Octob.
♐	-	-	-	-	-	- Novemb.
♑	-	-	-	-	-	- Decembr.
♌ + ♐	-	-	-	-	-	- de Juillet jusqu'a Novembr.

♋ Signifie qu'ils fleurissent tout l'ete ou bien la plus grande partie de l'Année.

† Signifie qui portent de belles fleurs.

EX;

EXPLICATION

Des Caracteres de la Seconde Colonne Regardant leur traitement ou leur Culture.

- a. Fait Connoitre, Celles qui restent en grand air, ou en pleine terre sans aucune Couverture.
- b. Signifie, Celles qui restent en pleine terre, étant couvertes, de paille, de nattes, ou feuilles seches pendant l'Hyver.
- c. — — qui peuvent etre Conservées dans une serre sans feu étant seulement gardées de la gelée.
- d. — — qui restent aussi dans une serre sans feu, mais qui doivent etre posées pres de fenestres, ou dans un Lieu ou ils peuvent recevoir le soleil & plus d'air frais.
- e. — — qui doivent etre Conservées dans une serre un peu Rechauffée.
- f. — — qui ont besoin la meme Chaleur que les Ananasses.
- g. — — qui doivent avoir la plus grande Chaleur.
- o. — — Celles qui doivent rester toute l'année dans les serres, ne pouvant Souffrir l'inconstance de notre Climat.
- x. — — qui ont besoin d'etre mise au printemps, dans une serre remplie de tan pour les faire Croître.
- f. — — Celles a qui on doit donner tres peu d'eau pendant l'Hyver.
- ff. — — Celles a qui on ne doit pas absolument donner de l'eau pendant l'Hyver.
- * — — plantes ou oignons d'afrique qui étant planté dans une Planche en pleine terre couverts avec de verres pendant l'Hyver & bien gardées pour toute gelée, Croissent plus fort & fleurissent plus volontiers que quand ils sont planté dans de pots & mise en les serres.

LES LETTRES

*Qui se trouvent derriere les noms
denotent.*

- B.** Boerhaven, index alter Plantarum, Lugduni Batavorum, apud P. van der Aa, 1720
- R.** A. van Royen floræ Leydenſis Prodrômus Lugduni Batavorum, apud S. Luchtmans, 1740
- L.** C. Linnœi, ſpecies Plantarum, Holmiæ, 1753
- M.** P. Miller Gardeners dictionary Sixth edition, London 1752
- T. Z.** J. Burmanni Theſaurus Zeylanicus, Amſtelædami 1737
- B. D.** J. Burmanni Decades plantarum africanarum Amſtelædami, 1738
- T.** Tournefort, Inſtitutiones rei Herbariæ, Paris 1719.
- C.** C. Commelinus, icones Plantarum Lugduni Batavorum, 1716

Ou on trouve ces plantes aux nombres
qui y ſont ajoutes.

C A-

C A T A L O G U E

D E S

PLANTES ETRANGERES,

Habitus

Cultuure

- | | | |
|-----------------------|----------|---|
| A. | a. | 1. Abies taxi folio Subtus argenteis, <i>Picea Vulgo</i> B. 1. |
| A. | a. | 2. - - - tenuiori follo, B. 2. |
| A. | b. | 3. - - - Virgin. taxi folio, vel <i>Pinus Virg. fol. simplicibus taxi similis.</i> |
| A. | b. | 4. - - - Virg. fol. Cæseis, vel <i>Pinus ame. rectus conis minimus.</i> |
| A. | b. | 5. - - - fol. fasciculis acumipatis R. 3. <i>Larix orient</i> B. & T. <i>Cedrus Libani Vulgo.</i> |
| A. | c. | 6. - - - af. fol. Cæseis, vel <i>Pinus af. fol. simplicibus Cæseis Conis nigro maximo.</i> |
| A. | c. | 7. - - - eadem Conis minoris. |
| V. | g. o. | <i>Abrus</i> R. pag. 534. <i>Glycine</i> L. 5. |
| A. \equiv | c. | 1. <i>Absinthium orient. frutesc. incanum amplo folio tenuissimo diviso.</i> B. 2. |
| A. m | a. | 2. - - - ponticum B. 3. <i>Artemisia</i> R. 2. |
| P. m | | 3. - - - pontic. tenui fol. incanum B. 7. <i>Artemisia</i> R. 3. |
| A. Ω | a. | 1. <i>Acacia am. abruce fol. Spina triplici donato</i> B. 8. <i>Cæsalpinoïdes</i> R. pag. 535. <i>Gleditsia</i> L. 1. |
| A. Ω | a. | 2. - - - am. abruce fol. triacanthos capsula ovali, semen unicum Claudente M. 2. <i>Gleditsia</i> L. 2. |
| F. | f. o. x. | 3. - - - foliis amplioribus ramis purpurascente silliquis Circinatis, P. <i>Mimosa</i> L. 8. |
| A. $\text{m} \dagger$ | e. | 4. - - - Vera fl. luteo odorato B. 1. <i>Mimosa</i> R. 8. |
| A. | 5. | 5. - - - Ægyptiaca fl. albo B. 2. <i>Mimosa</i> R. 3. |
| | | A 6. <i>Acacia</i> |

Habitus

Cultivare

- A. e. 6. *Acacia* af. foliis pinnis avium referens.
spinis geminis reflexis.
- F. m e. o. 7. - - - am. non spinosa, fol. tenuissimis
glabris florib. globosis albis M. 16.
- A. m + e. o. 8. - - - am. non spinosa, fl. globoso albo
M. 13. *Mimosa* R. 13.
- A. e. o. x. 9. - - - similis, mexicana, spinis Corni-
bus similis B. 4. *Mimosa* R. 2.
- F. f. o. 10. - - - *Madagascariensis* toto spinosa, *Mi-
mosa* L. 27.
- A. g. o. x. *Acajou* arbor amer. *Anacardium* L.
- P. S + b. 1. *Acanthus* fativus vel molli Virgili B. &
R. 1.
- P. S + b. 2. - - - rarioribus & brevioribus aculeis
munitis B. 2.
- P. c. 3. - - - orient. humill. fol. pinnatis acu-
leatis B. 4 R. 2.
- A. a. 1. *Acer* Platanoïdes fol. Eleg Variegato M. 8.
- A. a. 2. - - - Virg. max. fol. trifidis & quinquif.
B. & R. 5.
- A. a. 3. - - - Virg. fol. palmatis caule rubente
om. max.
- A. a. 4. - - - america: sacharifera.
- A. S c. 1. *Acetosa* arbor. subrotundis fol. B. 4. *Ru-
mex* R. 8.
- P. c. 2. - - - af radice repente fol. bipennis.
- P. S + + a. 1. *Achillea* fol. duplicato pinnatis glabris
Elegant varieg. *Millifolium* B. 15.
- P. S + + a. 2. - - - fol. dup. pinn. glabris fl. rubro,
Millifolium B. 1.
- P. S + + a. 3. - - - fol. Linearibus pinnatifidis Villo-
sis R. 2. *Millifolium tomentosum* B. 9.
- P. S + + b. 4. - - - fol. pinnatis duplicatis flore au-
reo, *Millifolium* B. 7.
- P. S + + b. 5. - - - eadem flore sulphureo, *Millifo-
lium* or. fl. flavescens B. 8.
- P. S + + b. 6. - - - fol. pinnatis fl. aureo R. 6. *Age-
ratum* B. 6. *Pteris* orient. fol. tanaceti
incanis fl. aureo T.

Achi-

Habitus

Cultuure

- P. Ω = † e. 7. Achilœa fol. duplicato pinnatis foliolis ova-
tis integris R. 12.
- P. Ω + † a. 8. - - - fol. lanceolatis obtusis acute Ser-
ratis, R. 10. *Ageratum*, odoratum, B. 2.
- P. Ω m † a. 9. - - - fol. integris R. 7. *Ptermica* fl. albo
B. 1.
- P. Ω m † a. 10. - - - eadem fl. pleno, *Ptermica*, B. 2.
- P. Ω + † b. 11. - - - fol. Sinuato Lacineatis planis Vil-
losis nitidis R. 9. *Ptermica* B. 7.
- P. Ω + † a. 12. - - - fol. lanceolato dentato R. 8. *Pter-
mica incanis* Serratis folio fl. albo B. 6.
- P. Ω + † a. 13. - - - quæ est, *Millefolium* max. Um-
bella alba B. 4.
- P. Ω m † c. 14. - - - fol. duplicato pinnatis tomentosis
R. 12. *Ptermica Santolinæ* fol. fl. minore T.
- F. ♂ e. Achyrantes R. *Amarantus Siculis* Spicatus
radice perenni B. 17.
- B. ≈ † a. 1. Aconitum hyemale M. *Helleboroides* B. *Hel-
leborus* R. 4.
- P. Ω † a. 2. - - - *Lycostonon* Luteum R. 1.
- P. Ω † a. 3. - - - luteum majus ampliore caule B. 2.
- P. Ω † a. 4. - - - Cœruleum B. 5. R. 3.
- P. Ω a. 5. - - - Salutiferum sive Anthora B. & 5.
- P. Ω † a. 6. - - - flore ex Cœruleo & albo Varie-
gato B. 7.
- P. Ω † a. 7. - - - Cœruleo purpureo maximo B. 6.
- V. ♂ † e. 8. *Acriviola* maxima odorato fl. pleno M.
Tropæolum L.
- P. m a. 1. *Actea* Caule inermi R. *Christophoriana* B. 1.
- P. m † a. 2. - - - Racemis Longissimus, fructibus Uni-
capsularis L. 2.
- A. c. 1. *Adhatoda* Zeylanensium fl. galea concava
B. 1. *Justitia* R. 1.
- A. Ω w e. 2. - - - indica fol. Saligno fl. albo, B. 2.
Justitia R. 2.
- F. Ω w † e. o. 3. - - - Malabarica Spica Longiss. fl. re-
flexo, T. Z. *Justitia* L. 2.
- P. c. *Adiantum* ramosum pediculis Lucidis &
nigris R. 2.

Habitus

Culture

R. 8 †

a.

Adonis hellebori radice bubthalmi flore B.

3. R. 2.

F.

c. o. x.

Æchynomene Caule Lævi herbaceo folio-
lis obtusis R. 4.

P. II

b.

Agrimonioïdes B. Agrimonia R. 2.

A. 2 †

g. o. x.

Ahoai T. Tbevetia R. Cerbera fol. Linear-
bus Longiss. L. 3.

A. m 8 †

d.

1. Alaternoïdes afr. erice fol. fl. albicante
muscoso B. 1. Pbylica R. 1.

A. 8

c.

2. - - - af. telephi Legitimi
Imperati folio mas. }

Clutia R. 2.

A. 8

c.

3. - - - eadem scemina. }

A. 8

c.

4. - - - lauri serratæ folio B. 3. Celastrus
R. 3. Ceanothus L. 3.

F.

d.

An; Alaternoïdes afr. ericæ fol. similis,
arbuscula incognita.

A. 8

b.

1. Alaternus Hispanica B. 1. Rhamnus R. 8.

A. 8

b.

2. - - - latifolio ex aureo & viridi varie-
gato, B. 2.

A. 8

b.

3. - - - minori folio B. 4.

A. 8

c.

4. - - - seu Phyllirea fol. ex Luteo Varie-
gato B. 6.

A. 8

b.

5. - - - seu Phyll. fol. ex albo variegato B. 7.

F. 8 †

d.

1. Alcea frutes. afr. fol. Grossularicæ glabra
fl. parvo rubro B. 13. Malva R. 3.

F. 8 †

d.

2. - - - frutes. afr. amplo hirsuto fol. fl. rubro.

F. 8 †

d.

3. - - - frutes. afr. amplissimo fol. fl. amplo
kermosino M. 8.

P. 8 m †

a.

4. - - - Vulgaris major fl. Candiore B. 3.

P. 8 m †

a.

5. - - - vulgaris fl. ex rubro roseo B. 2.
Malva R. 6.

P. II →

a.

1. Alchimilla alpina pubescens minor B. 2.

P. II →

a.

2. - - - foliis digitatis B. 3 R. 2.

P. 8 →

a.

1. Alkekengi officinarum B. 1. Pbyfalls R. 2.

P. 8 → †

c.

2. - - - Curassavicum fl. viete sulphureo
fundo purpureo B. 8. Pbyfalls R. 2.

P. 8 →

d.

3. - - - Bonariensis repens bacca turbinato
Pbyfalls R. 4.

4. Al-

Catalogue des Plantes Etrangères.

5

Habitus

Culture

- F. 8 e. 4. Alkekengi fruticoso fructi parvo B. 7. *Physalis* R. 4.
- P. c.f. 1. Aloë americana major B. 5. R. 1.
- P. c.f. 2. - - amer. major foliis ex argent. striatis.
- P. c.f. 3. - - amer. major fol. ex aureis Eleg. variegatis
- P. e.o.f. 4. - - amer. Sobolifera B. 7. *Agave* L. 2.
- P. c.f. 5. - - amer. major fol. Longiss. & angustiss. B. 6. ex vera Cruce major Vulgo.
- P. e.o.f. 6. - - amer. fol. glauco spinosa, B. 8. ex vera Cruce minor tuberoso Vulgo.
- P. e.f. 7. - - amer. viridi, piet dicta B. 10. R. 8.
- A. d.f. 8. - - amer. folio Juccæ arborescens, B. 45.
- A. c.f. 9. - - amer. draconis fol. serrato B. 11. *Cordyline* R. 2. *Jucca* L. 2.
- A. e.o.f. 10. - - amer. arborescens *Canna indicifolio*.
- A. = + b.* 11. - - afric. fol. triangulo Longiss. & angustiss fl. Luteis B. 43. R. 8 *iris uvaria* vulgo.
- P. = + b.* 12. - - eadem, in omni parte majoribus B. 44.
- A. e.o.f. 13. - - afric. Caulescens fol. magis glaucis Caulem amplectentibus, C Fig. 44
- A. d.f. 14. - - afr. Caules fol. glaucis Caulem amplectentibus B. 21. *aloë arborescens* vulgo.
- P. d.f. 15. - - afr. Caules fol. glaucis breviss. Caulem amplectent. B. 15.
- P. = + d.f. 16. - - afr. fol. glaucis margine & dorsi superioribus spinosis fl. rubro B. 18.
- A. d.f. 17. - - afr. Caulescens fol. Crasso obscure viridi B. 39.
- A. e.o.f. 18. - - afr. Caul. fol. Crasso amplo viridi ad Latera & indorso spinoso.
- A. d.f. 19. - - afr. Caul. fol. Crasso brevi obscure viridi.
- P. d.f. 20. - - afr. Caul fol. spinosis in dorsi maculis albicantibus notato.
- P. d.o.f. 21. - - afr fol magis glaucis Caulem amplectentibus in margine & dorsi verrucosis.
- A 3 22. Aloë

- P. 1. 7. 11. d. f. 22. Aloë afr. breviss. & Crassissimo folio B. 22.
R. 12.
- P. 1. 1. d. f. 23. - eadem verrucosis.
- P. 8. 1. d. f. 24. - afr. humilis spinis inermibus & verru-
cosis B. 23. R. 4.
- P. 1. d. f. 25. - - afr. humilis spinis inermibus B. 28.
R. 14.
- P. 1. d. f. 26. - afr. humilis fol. ex albo & viridi varieg.
B. 24. R. 11.
- P. 3. 8. d. f. 27. - - afr. humilis fol. triangularis, glabro
atro viridis ex semen margaritifera dege-
ner, Pater aloë afr. Erecta rotundi fol. par-
va, Mater aloë afr. margaritifera major.
- P. 1. e. o. f. 28. - - afr. humilis fol. triangular. rigido albi-
cante C. Fig. 48.
- P. 1. e. o. f. 29. - - afr. humilis spinis herbaceis, aloë arach-
noidea vulgo.
- P. 1. d. f. 30. - - afr. Margaritifera major. } B. 31.
P. 1. d. f. 31. - - afr. marg. media. }
- P. 1. d. f. 32. - - afr. marg. minor B. 26.
- P. 1. d. f. 33. - - afr. marg. maxima in dorso solo ver-
rucoso.
- P. 1. e. o. f. 34. - - afr. marg. minima fol. multo Longio-
ribus B. 27.
- P. 8. d. f. 35. - - afr. erecta triangularis & triangulari
folio B. 32 R. 10.
- P. 8. d. f. 36. - - afr. eadem Caule & fol. gracilis.
- P. 11. d. f. 37. - - afr. erecta rotundi folio parva B. 33. R. 9.
- P. 1. d. f. 38. - - afr. minima atro viridis spinis herba-
ceis B. 40 R. 13.
- P. 11. e. o. f. 39. - - afr. min. pallide viridis & non spinosis.
- P. 1. e. o. f. 40. - - afr. arborescens, montana plicatile
folio, B. 34
- F. 5. 1. d. f. 41. - - afr. fol. planis Conjugatis carinatis
verrucosis.
- P. 5. 1. d. f. 42. - - afr. fol. Longis Conjug. margaritifera
fl. rubro Elegantiss. B. 38.
- P. 5. 1. d. f. 43. - - afr. fol. planis Conjugata fl. Corallini
Colore, B. 36.
44. Aloë

Habitus	Culture	
P. ☉ †	d. f.	44. Aloë afr. ut præcedente fol. ex albo Eleganter striatis.
P. ☉ †	d. f.	45. - - afr. fol. planis Conjug. maculis albicant. notato fl. rubro B. 35.
P. ☉	d. f.	46. - - afr. fl. rubro fol. triang. verrucosis ab utraque parte albicantibus notato B. 25.
P. ☉	d. f.	47. - - afr. fl. rubro fol. triang. maculis albicantibus ab utraque parte notato B. 37.
A.	e. f. o.	38. - - afr. arborescens. fol. Cylindraccis Cinereis margine spinosis.
P. ☿ †	d. f.	49. - - afr. Vulgaris B. 1. R. 3. <i>Tricolor vulgo.</i>
P.	d. f.	50. - - afr. vulg. similis major maculis albis picta B. 2.
P. ☿ †	d. f.	51. - - vera minor, B. 3. <i>Succotrina vulgo flore Phœniceo.</i>
P.	d. f. o.	52. - - Caballina.
P.	d. f. o.	53. - - Caballina major.
P.	f. f. o.	54. - - Zeylanica pumila fol. varieg. B. 42. R. 7.
P. ☿ †	f. f. o.	55. - - Guëneënsis fol. ex viridi & atro undulato variegato B. 41. R. 6.
A. ♀ †	c.	1. Althea frutescens, bryoniæ fol. B. 7. <i>Malva</i> R. 7.
A. ♀ †	c.	2. - - maritima arborca veneta, B. 9. <i>Lavatera</i> R. 1.
A. ☿ †	a.	3. - - flore albo maculato, <i>ketmia</i> B. 3.
A. ☿ †	a.	4. - - flore Purpureo, <i>ketmia</i> B. 2.
A. ☿ †	a.	5. - - flore Rubro.
P. ♀ †	a.	1. Alyssum fol. lanceolatis integris. R. 6. <i>Alysson</i> B. 2.
P. ♀ †	b.	2. - - eadem fol. Elegantissimo variegato.
P. ♀ †	b.	3. - - alpinum hirsutum Luteum, B. 17. <i>Draba</i> R. 2.
F.	e.	Amaranthoides fruticosis caule erecta, <i>Comphrena</i> L.
B. ≈	a.	1. Amaryllus spatha uniflora R. 1. <i>Lilionarcissus luteus autumnalis</i> T.
B. ♀	b.	2. - - spatha uniflora R. 2. <i>Lilionarcissus indicus</i> flore ex albo exterius rubento T.
		3. Ama-

Habitus

Cultuure

B. γ T

c. ff. x.

3. Amaryllus spatha uniflora R. 3. *Lilionarcissus flore sanguineo mutante.*

B. η T

e. *

4. - - - spatha multiflora R. 4. *Lilionarcissus Rutilo flore B. 3.*

B. η T

e. *

5. - - - spatha multiflora fl. suave rubente; *Lilionarcissus indicus flore suave rubente petalis undulatis.*

B. ε T

b. *

6. - - - spatha multiflora R. 5. *Lilionarcissus polyanthos fl. incarnato fundo ex luteo albescente B. 4.*

B. ε T

6. *

7. - - - spatha multiflora, *Lilionarcissus max. polyanthos flore albescente.*

B. ε T

b. *

8. - - - spatha multiflora R. 7. *Lilionarcissus Zeylanicus flore niveo, externe purpureo striato B. 5.*

B. ε T

b. *

9. - - - spatha multiflora bulbo rotundo, flore ex albo & purpurascente, mixto.

B. II T

c. ff. x.

10. - - - bulbo rotundo, spatha multiflora, *Lilionarcissus africanis fl. kermosino.*

R.

f. ff. o. x.

1. Amomum spica ovata R. 1. *zinziber angustiori folio.*

R.

f. ff. o. x.

2. - - - spica oblonga obtusa R. 2. *zinziber latifolium B. 1.*

F. ε T

a.

Amorpha R. barbajovis amer. flosculis purpureis.

F. δ T

a.

1. *Amygdalus nana R. 3.*

F. δ T

a.

2. - - - nana flore pleno.

F. η

d.

Ambarum spirans; Anthospermum mas R. Coma aurea similis B. 9.

P. η T

a.

1. *Anacampseros purpurea B. 8.*

P. η

a.

2. - - - fl. pallido rubell R. 7.

P. II

a.

3. - - - radice rosam spirante majus B. 10. *Rhodiola R.*

P. II

a.

4. - - - rad. rosam spir. fol. Cæsiis minus ferratis B. 11. *Rhodiola R.*

P. II T

a.

5. - - - rotundiori folio Sempervirens B. 12.

P. δ T

d.

Annagallis Cærulea B. 4. Annagallis monelli vulgo.

Ana.

Catalogue des Plantes Etrangères.

29

Habitus

Culture

- F. *strobilata* C. *longa* Anagyris foetida B. & R.
- P. f. f. o. x. 1. Ananas fol. vix ferrato B. 5. non spinosa
vulgo.
- P. f. f. o. x. 2. aculeatus fructu ovato carne albido
M. 1.
- P. f. f. o. x. 3. aculeatus fructu pyramidato ex
viridi flavescente M. 6.
- P. f. f. o. x. 4. aculeatus fructu pyramidato. carne
aurea B. 1. Bromelia R. 1.
- P. f. f. o. x. 5. aculeatus fructu ovato carne rubra
ex malacca dicta.
- P. f. f. o. x. 6. sylvestris brasiliana kerbita vulgo
B. 2.
- P. f. f. o. x. 7. amer. sylvestris altera minor, pin-
guin dicta B. 3.
- R. 8 + a. Anapodophyllon Canadensis B. Podophyl-
lon R.
- P. 9 a. 1. Anemone Virgini. fl. albo B. 2. R. 2.
- R, 8 + b. 2. Hortensis latifolium fl. simplici
purpurascens B. 3.
- Anemones d'ont on peut avoir une Collection
de plus que 300 especes differentes extre-
mement belles, en toute sorte de Couleurs,
& des quelles on trouve annuellement le
Catalogue, avec leur noms, Couleurs, &
juste prix.
- R. 8 a. 1. Anemonoides fl. albo pleno B. 10.
- R. 8 a. 2. fl. luteo bino & terno B. 9 ane-
mone R. 4.
- R. 8 + a. 3. fl. pleno purpurascens B. 3.
- F. 8 + d. 1. Anemonospermus afr. fol. Jacobæa fl. lu-
teo extus puniceo B. 1. Arctotis R.
- F. 8 + d. 2. afr. fol. Cardui benedicti fl.
radiis intus albicantibus, Arctotis R.
- P. 9 d. 3. afr. fol. plantaginis florum ra-
diis aureis extus fuscis, B. 3. Arctotis R.
- P. 8 d. 4. afr. Caule foliisque fol. Cordato
Lanuginoso.
- F. 8 + d. 5. afr. fol. Jacobæa tenuiter Laci-
neato
B

		neato flore auranteo pulcherrimo B. 4.
		<i>Arctotis</i> R. 2.
F. ♂ †	d.	6 <i>Anemonospermum</i> afr. folio <i>Jacobæo</i> tenuiter lacineato fl. intus albis extus purpurascens, <i>Arctotis</i> R.
P. ♂	d.	7. - - - afr. fol. & facie <i>taraxici</i> incanis B. 4. <i>Arctotis</i> R. 4
P. ♂ †	d.	8. - - - afr fol rigidis infra cinereis fl. amplo aureo maculis ex punicante & albo insignito M. 7.
P. ♀	a.	<i>Angelica Sativa</i> R. & B.
A.	f. o. x.	<i>Annona</i> fol lanceolatis R. 3. <i>Guanabana</i> P.
B. ♂ †	d *	1. <i>Antholyza</i> L. 1. <i>Gladiolus floridus</i> rictum referens coccineis.
B. ♂ †	d *	2. - - - L. 2. <i>Cunonia</i> , spatbis max. sive <i>Gladiolus etbiop</i> fl <i>Elegantiss.</i> coccineis.
B. ♂ †	d *	3. An, <i>Antholyza</i> afr omn maximum flore magno Eleganter rubro.
P. ♂	d	1. <i>Antirrhinum</i> fol ovato Serrato R 8 <i>Linaria bellides</i> folio T.
P. ♂ †	b.	2. - - - angustifolio <i>Linaria</i> fl rubro ricto Luteo.
P. ♂ †	c.	3. - - - angustifolio <i>Linaria</i> Eleganter variegato, flore, rubro ricto Luteo B. 11.
P. ♀ †	a.	4. - - - floribus Laxe spicates R 14. <i>Linaria purpureo major</i> B. 3.
P. ♂ †	d.	5. - - - vel <i>Linaria boetica</i> angustif. fl. atro rubento.
R. V.	a.	<i>Apios americana</i> B <i>Glycine radice tuberosa</i> R. 1.
P. m	b.	<i>Apium macedonicum</i> B. <i>Rubon</i> R 2.
P. ♂ m †	a.	1. <i>A ocynum</i> am. fl. lilii <i>Convallium</i> suave rubentis B 10. R. 1.
P. ♀ †	a.	2. - - - Canad. erectum angustif. fl. rubicundis B. 5 <i>Asclepias</i> R. 5.
F. ♂ †	e.	3 - - - amer. fol. glabriore fl umbellā auranteo B. 17. <i>Asclepias</i> R. 7.
P. ♀ †	a.	4. - - - vel <i>apocynoides</i> nova anglia radice tuberosa, floribus auranteis, <i>Asclepias</i> R. 6.
		5. Apo-

Habitus	Culture	
P. Ω †	a.	5 Apocynum latifolium incanum fl. obsoleto purpurascens B. 1. <i>Asclepias</i> R. 4.
F. ♂ †	d.	6. - - - afr. fol. salicis lato glabro fl. albo B. 15. <i>Asclepias</i> R. 3.
F. ♂ †	d.	7. - - - afr. fol. salicis angusto glabro fl. albo B. 16.
F.	d.	8. - - - Caule erecto arborea foliis ovatis acutis R. 3.
✓ Ω	d.	6. - - - af schandens Vince pervince fol. sub incanis B. 18. <i>Cynanche</i> R. 6.
F. Ω	d. b.	10. - - - af. fruticos. fol. subrotundo fl. albo B. 11.
A. ♀	d.	11. - - - frutes. latis & undulatis fol. floribus umbellatis fructu gemine sulcato spinoso B. D. 2.
P. Ω	a.	12. - - - Virg. androssemi folio fl. albo radice repente.
F.	e.	13. An, apocynum fruticosum fol. ternis Lanceolatis.
A.	b.	1. Aquifolium Caroliniensis fol. ovato Lanceolato dentato.
A.	a.	2. - - - echinata fol. superficie B. 10.
A.	a.	3. - - - echinata fol. superficie ex albo & viridi Eleg. Varieg.
A.	a.	4. - - - latifolium spinis & Limbus argenteis.
A.	b.	5. - - - angustifolium spinis & Limbus argenteis.
A.	a.	6. - - - lauri folio spinis viridis.
A.	a.	7. - - - eadem Limbus & spinis aureis.
A.	a.	8. - - - angustifol. spinis & Limbus aureis.
A.	a.	9. - - - angustifol. aureis spinis & Limbus viridis.
A.	a.	10. - - - latifolius spinus & Limbus aureis.
A.	a.	11. - - - latifolius ex viridis & aureis Eleg. variegato.
P. II †	a.	1. Aquilegia fl. pleno purpureo B. 8.
P. II †	a.	2. - - - fl. pleno variegato B. 11.
P. II †	a.	3. - - - fl. pleno stellato varieg.
		B 2 4. Aquifolium

Habitus	Culture	
P. II +	a.	4. Aquilegia fl. pleno Rubento ferrugineo.
A.	c.	Aralia Caule aculeato R. 1. <i>Christopboriana arbor aculeata virginiana</i> B.
A. 8 +	a.	Arbor Judæ, Siliquastrum B. <i>Cercis</i> R. 1.
A. 9 +	a.	Arbor Tulipifera, <i>Liriodendron</i> R.
F. 9 +	d.	Arbuscula afr. anonyma hedyssarii facie foliis pinnatis fl. rubro spicato.
A. 3 +	b.	Arbutus foliis serratis B & R. 1.
P. II	a.	1. Aristolochia Caule erecto R. 1. B. 2.
P. II +	b.	2. - - - Caule infirmi fl. ex purpura nigro B. 1. R. 2.
P. 5 +	b.	3. - - - semper virens similacis folio floribus recurvus solitariis pendulis B. & R. 3.
P.	c.	4. - - - Caule erecto folio Cordato lanceolato R. 6.
P. 7	a.	Artemisia foliis ex argenteis variegatis B. 3.
P. 7 +	d. *	1. Arum ægyptiacum Vulgo B. 6. <i>Calla</i> R. 2.
P. 7 +	d. *	2. - - - afr. fl. albo vix odoratis minus B. 7.
B.	a.	3. - - - foliis palmatis Caule maculato R. 1. <i>dracunculus</i> B. 1.
B.	a.	4. - - - foliis palmatis Caule non maculato R. 2.
P.	c. o. f.	5. - - - fol. peltatis ovatis R. 3. <i>Colocasia</i> B. 1.
P.	f. o. f.	6. - - - acaulos, fol. Cordatis obtusis cum acumine, R. 6. <i>arum maxim. macrorrhizo Zeylanica</i> .
P.	f. o. f.	7. - - - acaule fol. sagittatis triangularis R. 9. pediculis & foliorum atropuniceis.
P.	c. o. f.	1. - - - Zeylanica minus pediculis puniceis <i>Colocasia</i> B. 4.
P. m	f. o. f.	9. - - - Caulescens Canna indicæ folio L. 18. Arum arbor P.
P.	f. o. f.	10. - - - hederaceum amplis fol. perfoliatis, M. appendix.
R. II	a.	11. - - - Vulgare maculato R. 10.
R.	b.	12. - - - palustre radice arundinaceo B. 5. <i>Calla</i> R. 1.
		Arum

Habitus	Culture	
P. ☉	a.	Aruncus R. Ulmaria B. 2.
A.	d.	Argyrodendron, Zilverboom Vulgo, Protea R. 2. Conocarpodendron fol. argenteis seri- ceis latiss. B. 2.
P.	f. o.	1. Arundo Sacharifera B. 4. Saccharum R.
P.	e.	2. - - indica variegato, B. 3.
P. γ	a.	Asarum B. & R.
P. Ω †	c. o. f.	1. Asclepias aizoides afr. B. 4. Stapelia R. 1.
P.	e. o. f.	2. - - - aizoides af. fol. Compresso digita- to & Cristato B. 6.
P. Ω †	e. o. f.	3. - - - aizoides fl. pulchro simbriato B. 5. Stapelia R. 2.
P.	e. o. f.	4. - - - aizoides afr. ramorum erectis den- ticularis magnis, species noviss.
✓ ☉ m †	a.	5. - - - Caule volubilis herbaceo nigro flore R. 1. B. 3.
P. ☉	a.	6. - - - Caule erecto herbaceo fl. albo R. 2. B. 1.
P. ☉	a.	7. - - - Caule erecto herbaceo fl. flave- scente B. 2.
F. ♂ †	d.	1. Ascyrum balearicum frutescens max. fl. luteo B. 2. hypericum R. 1.
P. II †	a.	2. - - - magno flore B. 1. Hypericum R. 2.
✓ Ω	c.	1. Asparagus afr. schandens myrti fol. R. 7.
P.	d.	2. - - - af. tenui fol. viminalibus virgis B. 8. R. 3.
P.	d.	3. - - - af. aculeatis minor B. 7. R. 2.
P.	c.	4. - - - aphyllis spinis fasciculatis B. 4. R. 5.
P.	d.	5. - - - af. aculeatis fol. Linearibus lucidis spinis reflexis.
P.	c.	6. - - - af. inermis ramis declinatis B. 6.
P. II	a.	Asperula fol. quaternis ovato Lanceolato R. 3.
P. ☉ †	b.	1. Asphodilus luteis fl. & radice B. 5. R. 1.
R. ☉ †	a.	2. - - - alobrogicus magno fl. lilii. Li- liastrum alpinum B. Hemoracallis R. 2.
P. ☉	c.	Asplenium, five Ceterach B. 1 R. 7.
P. Ω	a.	1. Aster om. max. helenium dictum, B. & R. 1. B. 3. 2. Aster

Habitus

Culture

F. 8 +

d.

2. Aster af. frutesc. fol. angustis fl. Cœruleo
B. 27. R. 10.

F. 8 +

d.

3. - - sive bellis af. frutesc. fol. oblongo
rotundo rugoso fl. Elegantissimo Cœruleo.

P. 12 +

a.

4. - - atticus Cœruleis vulgaris B. 16. R. 15.

P. 12

a.

5. - - amer. latis & Crenatis fol B. & R. 9.

P. 12

b.

6. - - tripoli fl. angustiss. fol. B. 21. R. 8.

P. 12

a.

7. - - Canadensis, fol. imis amplioribus
Cordatis fl. Cœruleo M. 26.

P. 12

a.

8. - - Virg. Serrotinus parvo albente flore
B. 10. R. 7.

P. 12 +

d.

9. - - novæ anglie virga aurea facie fl.
Cœruleo.

P. 12 m +

a.

Asteroïdes alpina salicis fol. B. Bubthalmum
R. 5.

P. 8 +

c.

1. Asteriscus marit. perennis patulis B. 7. Bub-
thalmum R. 3.

F. m

c.

2. - - frutesc. leucoli fol. sericeis & inca-
nis; Bubthalmum R. 6.

P. 12 +

a.

1. Astragalus alpina alopecuroïdes, T. R. 1.

P. 12

c.

2. - - orient. fol. galegæ T. B. 3.

P. 12

3.

3. - - leguminibus subglobosis, floribus
spicatis R. 12. B. 3. Siliqua Curta.

P. 12

a.

Astrantia Corona floris Candida B. 2.

P. 12

a.

Atropa R. 1. belladonna vulgo, sive solanum
furiolum. 3.

P. 12

a.

1. Athamantia fol. Capillaribus R. 1. meum
fol. anethi B. 4.

P. 12

a.

2. - - fol. multifidis planis, R. 3. My-
sibolus B. 10.

F. 8 +

c.

Atractylus fol. oblongo ovato R. 2. Cartha-
mus afr. frutesc. ilicis folio, fl. aureo B. 2.

A. 12

b.

1. Atriplex latifol. sive halimus fruticosus B.
9. R. 5.

F. 12

a.

2. - - angustifol. fruticoso B. 11.

F. 12

c.

3. - - Caule fruticoso fol. arcuatis acutis
Sessilibus.

F. 12

d.

Atraphaxis incermis fol. undulatis R. 1. Ar-
bu.

Habitus

Culture

buscula afr. repens, fol. ad Latera Crispo

B. pars 2. pag. 263

A. b. Azedarach fl. Cœruleo B. 1. Melia R. 2.

A. Ω d. 1. Aurantium anglium dictum fol. ex albo varieg.

c. 2. - - - anglium dictum fol. ex aureo varieg.

c. 3. - - - Chinensis medulla dulci, Olyssiponensis Fer.

rari.

d. 4. - - - Chinensis, medullæ dulci, cortice tenui.

c. 5. - - - Chinensis medullæ acri.

c. 6. - - - Corniculatum, Ferrari.

d. 7. - - - Corniculatum fol. Eleg. ex aureo varieg.

c. 8. - - - Curasavica vera.

c. 9. - - - folio Crispo, Ferrari.

d. 10. - - - folio Crispo, Eleganter variegato.

c. 11. - - - fol. Crispo acuto fr. maxim. per maturæ

viridi.

c. 12. - - - fol. & fructu varieg. Virgatum Ferrari.

d. 13. - - - fol. & fructu ex aureo Eleg. varieg.

c. 14. - - - flores & fructu quasi umbellato.

c. 15. - - - fl. pleno fructu duppresso, flores duplici Ferrari.

c. 16. - - - fl. rubro fruct. atro viridis.

c. 17. - - - fructu amaro.

c. 18. - - - fructu dulci.

c. 19. - - - fructu duppresso, Bergamothi vulgo.

c. 20. - - - fruct. facie Limonis.

c. 21. - - - fruct. facie Limonis altera sorte.

c. 22. - - - fruct. oblongo glabro.

c. 23. - - - fruct. querci effigui.

c. 23. - - - fruct. incanellatum vel melonato, Stria-

tum Ferrari.

c. 25. - - - indicæ occidentalis, Pompeimoes fol. non Serrato.

c. 26. - - - indicæ occidentalis, Crispo folio.

c. 27. - - - indicæ occident. Crispo fol. per intervallo

variegato.

c. 28. - - - indicæ occid Crispo fol. quasi incanis.

c. 29. - - - indicæ occid. fol. valde Lobatis.

c. 30. - - - indicæ occid. fructu carno rubro.

c. 31. - - - indicæ orient. fol. Crispo fructu odoratissimo.

c. 32. - - - indicæ orient. fol. Crispo per intervalle

variegato.

c. 33. - - - indicus max. pompeimoes folio serrato, auran-

tium max. ferrari.

c. 34. - - - indicus max. surinamensis.

35. Her:

Habitus

Culture

- A. Ω d. 35. Aurantium Hermaphroditum fructu partim aurantii partim citrii, *Bisarre vulgo Aurant. Callosum Ferrari.*
- F. Ω d. 36. - - - Humilus Chinensis, vulgo nana, aur. sinensis *Ferrari.*
- F. Ω d. 37. - - - Humilus Chinensis fol. ex albo Eleg. varieg.
- F. Ω d. 38. - - - Humilus Chinensis fol. ex Luteo variegato.
- A. Ω c. 39. - - - salicis angustifolii fructu dulce.
- c. 40. - - - salicis ang. fol. varieg. fructu dulce striato.
- c. 41. - - - salicis Late follo.
- c. 42. - - - salicis late fol. variegato.
- c. 43. - - - schorfa grossa.
- c. 44. - - - schorfa grossa fol. acutis.
- c. 1. - - Limon angustissimo folio.
- d. 2. - - - aguezo apétito.
- c. 3. - - - agusto Rolâ di Portugal dulce.
- d. 4. - - - barbarino longo, *Pseudocitratus barbarinorum Ferrari.*
- c. 5. - - - bergamotte bisarreo
- c. 6. - - - bergamotto, della grande forte.
- c. 7. - - - bergamotto ordinario confoglia Liccia.
- c. 8. - - - bianco del ferrario.
- c. 9. - - - bisantinum.
- d. 10. - - - bisarreo fol. Elegantiss. varieg.
- d. 11. - - - Citrato giaretto.
- d. 12. - - - de Chios.
- c. 13. - - - de gaëta, *Cajetanus Ferrari.*
- d. 14. - - - de gaëta, foliis variegatis.
- d. 15. - - - de Surinaam.
- d. 16. - - - del Cabo du bona esperance.
- c. 17. - - - della grande forte di Lago st. Garda.
- d. 18. - - - della Gianda fructu dulce, coronato, *aker Limoen.*
- c. 19. - - - d'Hollande.
- d. 20. - - - di curacao.
- d. 21. - - - di curacao grande.
- c. 22. - - - di Geneve.
- [c. 23. - - - di Portugal.
- c. 24. - - - di Portugal grande.
- c. 25. - - - di Roma.
- c. 26. - - - di st. Remo oblonga Costa minori.
- c. 27. - - - digitato, *katte klaauw vulgo.*
- d. 28. - - - ex bisarreo degener.

Habitus

Culture

- A. Ω c. 29. Limon fol. duro Cordato.
 d. 30. - - fol. Crispo fructu Cucumerino.
 c. 31. - - fol. ex Luteo variegato, *Amstelveensebonte*.
 c. 32. - - fructu albo magno.
 c. 33. - - fructu aurei Coloris, *Goud limoen vulgo*.
 d. 34. - - fructu Cucumerino.
 c. 35. - - fructu dulce, *dulci medullæ Vulgaris Ferrari*.
 d. 36. - - fructu dulce fol. variegato.
 d. 37. - - fructu incanellato, *striatus Vulgatiior Ferrari*.
 d. 38. - - fructu incanellato, altera sorte.
 c. 39. - - incognita.
 c. 40. - - incognita altera sorte.
 c. 41. - - monströsa.
 c. 42. - - pomum adami communi Ferrari *zwarte Limoen*.
 c. 43. - - pomum adami altera sorte.
 d. 44. - - pomum adami Citrato.
 d. 45. - - pomum adami foetiferum, *alteram includens Ferrari*.
 d. 46. - - *Ponsino rubens, ferrari*.
 c. 47. - - *sainct remi, ferrari*.
 c. 48. - - *salerno*.
 c. 49. - - *ibardonijs, ferrari*.
 c. 50. - - *vulgaris, ferrari*.
 d. 1. Limonet, amer. fr. parva dulce.
 d. 2. - - Calabria major. { *Limon pucillis Calabrie Fer*
 d. 3. - - Calabria minor. { *rari*.
 d. 4. - - Calabria di napoli.
 c. 5. - - ex horto domini de Maraiz.
 c. 6. - - foliis undulatis.
 d. 7. - - fructu amaro, *Lima acris Ferrari*.
 d. 8. - - fructu dulce, *Lima dulcis Ferrari*.
 c. 9. - - ou Lumia a pyretto con foglia Liscia.
 d. 10. - - ou Lumia a Zuchetta.
 d. 11. - - ou Lumia d'hollande di fiore doppio.
 c. 12. - - ou Lumia racemosa, *Limon racemosa ferrari*.
 d. 13. - - salicis fol. *Lima fl. pleno vel salia*.
 d. 1. Cedro apyretto.
 d. 2. - - acuminato di St. Remo.
 c. 3. - - bergamotti.
 c. 4. - - del Zanten.
 d. 5. - - gaëtani.
 c. 6. - - grande Liscio bondolotto.
 c. 7. - - incognita.
 c. 8. - - incognita altera sorte.
 d. 9. - - *Judaica*.

C

ic. Ce

Habitus

Culture

d. 10 Cedro ordinario: cbl pigolo.

c. 11. - - - Vulgaris, citreum Vulgaris Ferrari.

P. 8

a.

Auricula urfi, d'ont on trouve chez le me-
me, un Collection de plus de 300. especes
les plus belles & Plus nouvelles; de toutes
fortes de Couleurs, d'ou on peut avoir
Annuellement, le Catalogue-Specifique de
leur noms. Couleurs & ouvrage, a Juste prix.

F. Ω

c.

1. Baccharis fol. dentato serrata R. 1. Sene-
cio B. 6.

F. Ω

c.

2. - - - fol. obverse ovatis, R. 3. Sene-
cio B. 7.

A.

d.

3. - - - fol. lanceolatis, R. 2. Arbuscula
nerii folio B. pars 2. pag. 263.

F. Ω

c.

1. Barbajovis Pulchre Lucens B. 1. Antbyllis
R. 1. B. 1. B. 1. B. 1. B. 1.

F. ♂ †

d.

2. - - - fol. Cœruleo B. 2. Psoralea R. 1.

F. ♂ †

d.

3. - - - hispanica incana fl. Luteo B. 3.
Cytisus R. 7.

F.

c. o.

1. Barleria spinis lateralibus, R. Coletta
veetla B.

F. ♀ †

d. o.

2. - - - axiliaribus fol. subrotundis inte-
gerrimus, L. 3. floribus albis odoratis

F. ♀

f. o.

3. - - - axiliaribus foliis Lanceolatis fl. albo.

✓ Ω

c. o.

1. Basella Caule palescente } B. Cuscuta R.

✓ Ω

c. o.

2. - - - Caule purpurascente. }

F.

f. o. x.

Bauhinia non aculeato fol. bicorni, R. 2.

A.

b.

Bension officinarum B. Laurus R. 4.

P. ♂ †

a.

1. Bermudiana iridis folio B. 1. Systryinchium
R. 2.

R. Ω

f. o.

2. - - - palma fol. radice phœniceo fl.
albo B. 2.

P. II †

a.

1. Betonica orient. spica florum Crassioris
B. 9. R. 2.

P. II

a.

2. - - - purpurco fol. Eleg. variegato.

A. ♀

a.

1. Bignonia simplici cordato fol. R. 1. Ca-
talpa vulgosa

✓ Ω †

a.

2. - - - amer. fraxini fol. fl. amplo phœ-
niceo B. 1. R. 4.

3. Bi-

Habitus	Culture	
V. \pm +	a.	3. Bignonia amer. schand. fol. pinnatis foli- liolis denticulatis M. 9.
V. \pm +	a.	4. - - - Caroliniensis parva fl. Coccineo.
P. δ	a.	1. Bistorta major radice intorta B. & R. 1.
P. δ +	b.	2. - - - alpina minima Sobolifera, B. 3. <i>Polygonum</i> L. 3, <i>Viviparum</i> .
A.	g. o. x.	Bixa, R. Mitella am. max. tinctora B. 4.
P. ∞	a.	1. Blattaria perennis fl. obsoleto fusco apice pistilla purpureo, B. 2.
P. ∞ +	a.	2. - - - perennis fl. amplo purpureo B. 5. <i>verbascum</i> R. 6.
P. ∞ +	a.	3. - - - perennis degener fl. amplo pallido Cæruleo.
A.	f. o.	Bonduc majus polyphyllum B. guilandina R.
P. γ +	b.	Borrigo Constantinop. fl. reflexo Cæruleo, B. 3. R. 4.
A.	c.	Bosia R. <i>Ferva mora dicta</i> .
R. γ ∞	c.	1. Bryonia afr. lacineata tuberosa radice B. 5. R. 3.
V.	c. o.	2. - - - Curassavi fol. dentato Crasso & succoso Caule B. 7. <i>Sicyos</i> R. 2.
P. δ +	b.	Bugula orient. Villosa fl. purpureo, B. 6. <i>teucrium</i> R. 7.
F. δ +	e. f.	1. Bulbine Caulescens. florib. aureis, R. 1. <i>phalangium</i> B. 5.
P. δ +	c. f.	2. - - - acaulis, fol. subulatis R. 3.
P. δ +	c. f.	3. - - - acaulis fol. lanceolatis carnosis R. 2.
P. δ +	c. f.	4. - - - acaulis - fol. Setaceis Caule angu- stiore R. 4.
P. δ +	c. f.	5. - - - acaulis, fol. Cæpæ succulentis flo- ribus spicato amplo aureo, <i>Phalangium</i> B. 6.
R. π	a.	Bulbocastanum majus fol. apii B. 1. <i>Bulium</i> R.
O. γ	a.	Bulbocodium fol. lanceolatis R. 1. <i>Colchicum</i> <i>vernum</i> T. 1.
P. δ +	a.	Bubthallum orient. tanacetii minoris fol. fl. luteo amplissimo B. 3.
A. π	c.	1. Beupleurum arbor. salicis fol. B. & R. 1. C 2
		2. Beu-

Habitus

Culture

F. ∞ d.F. ∞ c.F. ∞ a.F. ∞ b.P. π + c.P. δ + a.P. ∞ d.P. δ + d.F. ∞ + d.F. ∞ c.F. ∞ d.R. χ + c.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.P. ∞ + a.

A. c.

F. δ + d.P. ∞ e x.R. ∞ c. f x.R. ∞ c. f x.

2. Beupleurum linearibus vel Radicalibus pinnato incis R. 5.

Beupleuroïdes B. Pbyllis R.

1. Buxus fol. ex aureis variegatis B. 3.

2. - fol. parvis argenteis variegatis B. 16.

Calceolus marianus T Cypripedium R. 1.

2. Calamintha montana præalta fl. delute Cœruleo B. 6.

2. - Hispanica frutescens marii folio B. 5. Melissa R. 4.

Calendula fol. Linearibus R. 4. Caliba afr. crocii fol. fl. externe purp. interne albis B. 12.

2. - Caule fruticoso perenni R. 5. pag. 531.

Callicarpa L. frutez amer. Verticillata.

Calthoïdes M

1. Campanula Canar. atriplici foliis R. 11.

2. - persicæ fol. fl. albo pleno B. 5.

3. - persicæ fol. fl. Cœruleo pleno B. 3.

4. - urticae fol. fl. duplici albo B. 23.

5. - urticae fol. fl. duplici pallido.

6. - urticae fol. fl. duplici Cœruleo B. 21.

7. - maxima fl. albo fere digitalis B. 18.

8. - humilis fol. Cordato fl. oblongo B. 5.

9. - minor lineari fol. fl. albo B. 11.

10. - minor Lineari fol. fl. Cœruleo B. 10.

11. - amer. minor fol. rigidis B. 6.

12. - Humilis fol oblongo cordato fl. Cœruleo.

Camphorifera arbor, B. Laurus L. 3.

Camphorata, erice fol. fl. albo umbellato, Santolina B. 7. Selage R. 1.

1. Cannacorus ampliore flore, iridis palustre facie. Canna R. 2.

2. - amplissimo folio fl. rutilo M. 6.

3. - latifolio fl. luteo B. 1.

4. Can-

Habitus	Culture	
R. Ω	c. f. x.	4. Cannacorus latifolio variegato M. 2.
R. Ω	c. f. x.	5. - - - fl. Coccineo splendente B. 2.
F.	d.	Capparis Spinosa fol. rotundo B. & R. 1.
V. Ω	a.	1. Caprifolium perfoliat. sempervirens florib. speciosibus M. 10.
V. Ω	a.	2. - - - non Perfoliat fol. variegato.
F. Ω	e.	1. Capsicum caule fruticoso fr parvo erecto rubro M. 14.
F. Ω	e.	2. - - - caule fruticoso fr. parvo aureo rotundo M. 15.
F. Ω	e.	3. - - - caule fruticoso fructu amplissimo.
P. Ω †	c.	1. Carduus fol. & facie atracylus B. 24 R. 7. <i>acarna theophrasti</i> .
P. Ω	a.	2. - - - capite rotundo tomentoso B. 23. R. 11.
P. Ω	a.	3. - - - fl. rubro muschato capite nutante B. 16. R. 4. <i>Carduus nutans</i> T.
P. η	b.	Carex, afr fol. triangularis spica globosa.
A. η	f.	Carica R. Papaja fr. melopeponi effigie B.
P. Ω †	a.	Carlina acaulos fl magno albo fol. amplis tomentosis B. & R. 1.
A.	a.	Carpinus Virginiana florescens M. 5.
P. Ω †	a.	Caryophyllata alpina pumila fl. amplo aureo, <i>Caryophyllata alpina Lutea</i> T. <i>Geum aristis plumosus</i> L. 4.
P. Ω †	a.	1. Caryophyllus tenui fol plumariis fl. pleno amplo albo fundo purpurascence, <i>Dianthus</i> R.
P. Ω †	a.	2. - - - tenui fol. plum. fl. pleno amplo rubro, <i>Dianthus</i> R.
P. Ω †	b.	3. - - - chinensis latifol. fl pleno.
P. Ω †	b.	4. - - - chinensis angusti fol. fl. pleno, <i>Dianthus</i> R. 4.
P. Ω †	b.	5. - - - barbatus latifoliis fl. amplo pleno variegato.
P. Ω †	a.	6. - - - floribus solitariis fl. parvo rubro variegato.
P. Ω	a.	7. - - - Prolifera T. <i>Dianthus</i> L. 4.
		C. 3 8. Ca-

		Caryophylus Hortensis, Angelieren, Nelken ou Oeillats des quelles on trouve jusque à 200 espèces, des plus belles & plus nou- veaux en toute sorte de Couleurs. & Ouvrage d'ont on peut avoir le Catalogue, avec leur noms, couleurs & Prix
F.	c.	1. Cassia foliolis trium parium B. 10.
F.	f. o x.	2. - - foliolis quinque parium R. 2. Cassia fistula alexandrina B. 3.
P.	b.	3. - - foliolis sex parium, occidentalis.
F.	c.	1. Cassine vera floria danorum alterni serme facile M 2. ilex R 2.
P. =	d.	2. - - R. L 1. phyllyrea Capensis, Dill. Hort. Eltb. lepelhout vulgo.
A. = +	b.	3. - - fol. acutioribus fl. albo umbellato, Vulgo Thee boom.
A. =	c.	4. - - fol. rotundioribus fl. albo umbellato.
A. S	b.	1. Castanea sativa fol. Elegantiss. variegatis.
A. II +	a.	2. - - æquina fol. ex albo varieg.
P. δ +	b.	Catanance quorundam, B. & R. 1.
F.	f.	Ceanothus Racemis fol. ovatis enerviis L. 2.
A.	c.	1. Cedrus fol. Cypressi B. ex goa vulgo; Ju- niperis R. 7.
F.	c.	2. - - parva thuya facie baccis minimus.
A. η	o.	1. Celastris afr. fructu trilocularis R. 1. Rhamno similis afric. B. pars 2. pag 212.
F. η	a.	2. - - inermis novi belgi, corni scemine fol.
F.	a.	1. Celtis orient. minor fol. viridis & maculosis.
A.	a.	2. - - amer. fructu obscura purpurascens; M. 1. lotus arbor. fructu Cerasi.
F. Ω +	c.	1. Centaurea fol. tomentosis R. Jacea arborea argentea Ragusina B.
F. Ω +	b.	2. - - fol. tomentosis duplicato pinnato fl. purp. R. 14. Jacea B 30.
F. Ω +	c.	3. - - eadem fl. ex rubro roseo capitulis magnis.
P. Ω	a.	4. - - majus orient. glasti fol. fl. Luteo B. 1. R. 32.
		5. Cen

Habitus

Culture

P. Ω +

a.

5. Centaurea majus alpinum fol. pinnatis gla-
bris calice argentea non spinosa fl. aureo.

P. Ω +

a.

6. - - majus fol. pinnatis capite spinosa
fl. aureo.

P. Ω +

a.

7. - - majus fol. pinnatis capite non
spinosa fl. luteo.

P. Ω

a.

8. - - majus fol. foliatis fl. purpureo ca-
pite non spinoso.

P. Ω

a.

9. - - eadem fl. pallido.

P. Ω

a.

10. - - majus altiss. fol. integris & divi-
sis, capite non spinosa fl. purpureo.

P. Ω

a.

11. - - majus fol. lanceolatis integerri-
mus fl. purp.

P. Ω +

b.

12. - - majus latifol. caule alato, fl. ru-
bro capite spinoso.

F. Ω +

a.

Cephalanthus fol. binis & ternis R. 2.

F.

f. o. x.

1. Cerasus jamaicensis, Malpighia R.

A. η

c.

2. - - hottentottorum fol. rotundo crassiss.

B 6. Maurocenea R. Cassia L. 2.

A.

c.

3. - - hottentottorum minor fol. oblon-
go, Ligustrum capensis, Olea R. 3.

A. η +

c.

4. - - hottentottorum humillima fol. ob-
longo crasso.

A.

c.

5. - - hottentottorum, fol. amplo oblon-
go, an, maurocenea. Arbor lactejcens vulgo.

A. II +

a.

6. - - Hortensis fl. pleno.

A. II

b.

7. An cerasus arbor. am fol. lanceolatis den-
tatis fl. albo Bois de St. Lucie dicta.

A.

a.

Ceratonia R. Siliqua edulis B.

F.

c. o. ff.

1. Cereus erectus crassissimus spinis albis B. 6.
Cactus R. 6.

F.

e o. ff.

2. - - eadem spinis cinereis.

F. η +

e o. ff.

3. - - erectus septem angularis fl. purpuras-
cente Cactus R. 7.

F.

e o. ff.

4. - - erectus fr. rubro non spinoso B. 4.
Cactus R. 4.

F.

e o. ff.

5. - - erectus altiss. spinis Luteis B. 1.
Cactus R. 8.

F.

e o. ff.

6. - - erectus polygonis spinis flavis.

7. Ce-

Habitus

Culture

- | | | | |
|--------|-------------|-----|--|
| F. | e. o. ff. | 7. | <i>Cereus erectus polygonis atroviridis spinis flavis.</i> |
| F. | e. o. ff. | 8. | - erectus polygonis spinis fuscis. |
| F. | e. o. ff. | 9. | - erectus polygonis gracilis spinis albis. |
| F. | e. o. ff. | 10. | - erectus Polygonis gracilior spinis albis. |
| F. | e. o. ff. | 11. | - erectus Polygonis articulatis spinis albicantibus B. 13. <i>Cactus</i> R. 3. |
| F. | e. o. ff. | 12. | - erectus octangularis spinis primis albis, deinde variegatis. |
| F. | e. o. ff. | 13. | - erectus quadrangularis B. 9. <i>Cactus</i> R. 11. |
| F. x† | e. o. ff. | 14. | - erectus gracilis polygonis spinis fuscis, fl. albo <i>Cereus pyramidalis vulgo</i> , |
| | e. o. ff. | 15. | - erectus gracilior sex angularis spinis fuscis. |
| V. x† | e. o. ff. | 16. | - scandens polygonis fl. amplo pallide Luteo B. 11. <i>Cactus</i> R. 10. |
| V. II† | d o ff. | 17. | - scandens polygonis lanugine albescente fl. pulchro purpureo M. 13. |
| V. | d. o. ff. | 18. | - scandens trigonis articulatis B. 15. <i>Cactus</i> R. 12. |
| V. | e. o. ff. | 19. | - eadem Eleganter variegato. |
| P. | f. o. f. x. | 20. | - scolopendriæ fol. brachiato, <i>Cactus</i> R. 17. <i>opuntia</i> B. 11. |
- On trouve aussi les Numb. 1. 9. & 17. Croissant sur les Brochures des Rochers, etant belle & tres particulier.
- | | | | |
|-------|----|----|--|
| P. Ω | b. | 1. | <i>Cerinthe minor</i> fl. flavo R. 1. |
| F. δ† | b. | 2. | - fol. ovatis petiolatis R. 2. <i>Cerinthoides argentea</i> fl. pulchro <i>Ceruleo</i> B. 1. |
| F. x | c. | | <i>Chamæloea tricoccus</i> B. <i>Cneorum</i> R. |
| F. x | a. | 1. | <i>Chenopodium frutesc. sedi minori</i> fol. B. 2 R. 12. |
| F. x | c. | 2. | - caule infirmi sedi minoris ferecæis fol. |
| F. Ω | a. | | <i>Cherophyllum perennis cicutæ</i> fol. B. 2 R. 1. |
| P. Ω† | a. | 1. | <i>Chelone accadiensis</i> fl. albo B. & R. 1. |
| P. Ω† | a. | 2. | - accadiensis fl. purpureo. |

Habitus

Culture

F. ♂ †

d.

Chirœnea fol. Linearibus fl. amplo ruberrimo
R. 1. Centaurium minus af. arbor. C.

P. ♀ †

a.

Chondrilla perennis humilior fl. Cœruleo
B. 1. lactuca R. 4.

F. ♂ †

f. o. x.

Chrysobolanus fol. lanceolatis supra viridis
& infra argenteis.

P. ♀ †

a.

1. Chrysocomo calycibus laxis R. 1. Coma
aurea B. 1.

F. ♂ †

d.

2. - - - fruticoso fl. aureo majore R. 2.
Coma aurea B. 2.

F. ♂ †

d.

3. - - - fruticoso fl. aureo minore.

F. ♂ †

d.

4. - - - fol. linearibus fl. ante florescentiam
reflexo, R. 3. Conyza B. 7.

P. ♂ †

d.

5. - - - humillima fol. Linearibus fl. aureo
sæpe geminato.

P. ♀

c.

Chrysoplemium R. Saxifraga aurea dodonzi.

P. ♀

a.

Circium max. asphoduli radice B. 1.

F. ♀ †

b.

1. Cistus ladanifera, fl. albo maculo puni-
cante insignito B. 1. R. 2.

F. ♀ †

b.

2. - - - eadem fol. angustis.

F. ♂ †

c.

3. - - - fol. halimi primus Clusii fl. Luteo
B. 14. R. 7.

F. ♀

b.

4. - - - fol. Rosmarini fl. albo B. 17.

F. ♀ †

b.

5. - - - scemina fol. salviae fl. albo B. 11. R. 5.

F. ♀ †

b.

6. - - - fol. oblongo incano fl. purpureo
pallido B. 5.

F. ♀ †

b.

7. - - - fol. Undulatis & Crispis B. 7. R. 6.

F. ♀ †

b.

8. - - - fol. brevioribus fl. rubro B. 1.

A.

e.

1. Citharexylum amer. fol. ad marginem
dentatis L.

A.

d.

2. - - - amer. laurifolio fol. non dentato
Leucoxylum fol. laurinis alternis acumina-
tis B. D. 10.

V. ♀ †

a.

1. Clematis cœrulea vel purpurea B. 6. R. 5.

V. ♀ †

a.

2. - - - cœrulea vel purpurea fl. pleno B. 2.

V. ♀ †

a.

3. - - - peregrina fl. albo B. 3. R. 6.

V. ♀

a.

4. - - - fol. compositis foliolis lanceolatis
dentatis flor. ex viridis albicantibus.

D

5. Cle-

Habitus

Culture

V. ∞ ψ \dagger a.P. Ω \dagger a.P. Ω \dagger a.A. ∞ \dagger b.F. Ω d.P. ∞ \dagger a.P. ∞ a.A. δ c.A. δ o.A. ∞ f. o.B. m \dagger a.

A. m a.

F. δ \dagger c.F. Ω \dagger b.F. δ \dagger b.R. ∞ \dagger a.F. δ \dagger d.F. δ d.F. δ d.P. δ d.

A. d.

P. Π \dagger a.

5. Clematis fol. compositis glabris fl. albo odoratissimo.

6. - - - - - cœrulea erect. B 5. R. 1.

7. - - - - - sive flammula surrecta alba B. 1.
R. 2.

Clethra L. floribus pentapetalis albis.

Cliffortia fol. dentato R. 1.

1. Clinopodium fol. Linearibus R. 3. Satureja Virginiana B. 7.

2. - - - - - fol. lanceolatis L. 1.

1. Clusia foliis Petiolatis mas. } R. 1.

2. - - - - - foliis petiolatis scemina. }

Coffea R. Koffy boom batavis, Jasminum arabicum Castaneæ fol B.

1. Colchicum chionense fl. fritularia instar, tessalatis fol. undulatis, R. 2. B. 6.

2. - - - - - flore pleno B. 4.

3. - - - - - flore pleno variegato B. 5.

4. - - - - - fl. pleno, purpurascens.

5. - - - - - fl. candido B. 2.

6. - - - - - fl. candido fol. varieg.

7. - - - - - fl. maculato.

8. - - - - - fl. variegato.

9. - - - - - fl. purpurascens.

10. - - - - - fl. ex albo & purp. mixto.

1. Coluthea vesicaria fl. Luteo B. & R. 1.

2. - - - - - barbajovis fol. fl. phœniceo B. 4.
R. 2.

3. - - - - - oriental. fl. sanguineo B. 3.

4. - - - - - foliolis ovatis integerrimis M. 6.

Collinsonia L.

1. Coma aurea afr. fol. in extremitate trifidis B. 4. Santolina R. 3.

2. - - - - - aurea afr. in extremit. tenuiss. trifidis.

3. - - - - - aurea fol. chrithmi marini B. 3.

Commellina Procumbens fl. Luteo R. pag. 538.

Conocarpodendron, fol. saligno, Conifera, Lepidocarpodendron, Protea R. 2.

1. Convallaria latifol. fl. amplo M. 3.

2. Con.

Habitus	Culture	
P. II +	a.	Convallaria latifol. fl. pleno variegato M. 4. lilium Convallium fl. pleno B. 3.
P. II +	a.	3. - - - fl. rubente M. 2. lilium Conval- lium B. 2.
P. II +	a.	4. - - - humillima fol. cordato, R. 5. smilax humillima B. 2.
P. 6	a.	5. - - - fol. alternis R. 2. polygonatum B. 1.
P. 6	a.	6. - - - eadem fol. Elegantiss. varieg.
P. 6 +	a.	7. - - - fol. alternis fl. pleno, polygona- tum B. 4.
V.	f. o. f.	1. Convolvulus radice tuberosa R. 4. Batatas amer. vulgo.
V. 2 +	c.	2. - - - canariensis fl. purpurascens B. 3. R. 5.
V.	f. o. f. x.	3. - - - scandens radice tuberosa, Jalapa officinarum M. 18.
F. 8 +	c.	4. - - - major rectus creticus argenteis B. 5. R. 11.
F. 8 +	c.	5. - - - argent. fruticosus fol. Linearibus R. 12.
P. II +	a.	6. - - - af. arg. pumila fol. lanceolato fl. albo.
P. 6	d.	Conyza cretica fruticosa fol. molli candidissi- mo B. 6 R. 2.
A.	e.	1. Coralladendron fraxini fol. pubescenti- bus, floan.
A. 2 +	e.	2. - - - amer. spinosum fl. ruberrimo B. 1. erythrina R. 1.
A.	e.	3. - - - triphyllum amer. spinis nigri- cantibus B. 2.
F.	c.	4. - - - caroliniensis hastato fol. radice crassiss. R. 2.
A.	f.	5. - - - triphyllum am. caudice & nervi foliolis spinosis M. 6.
A.	f.	6. - - - amer. non spinosum, M. 2.
P. 2 +	a.	1. Coreopsis fol. Linearibus integris M. 2.
P. 6 m +	a.	2. - - - humilis fol. tenuiss. divisis.
P. 2	a.	3. - - - virg. altissim. fol. divisis non ferratis.
A. 6	a.	1. Cornus scemina fol. varieg. B. 3.

A.

2.

2. *Cornus mas* Virgin. involucro maximo fol. obverse cordato L.

A.

c. o.

Cornutia fl. Pyrimidato fol. incanis L.

B. 8 +

a.

1. *Corona imperialis*.

flore Luteo.

2. - - - *imperialis*.

fl. Luteo pleno.

3. - - - *imperialis*.

fl. rubro pleno.

4. - - - *imperialis*.

fl. rubro alato

caule.

5. - - - *imperialis*.

fl. rubro duplici

corona.

6. - - - *imperialis*.

fl. rubro folio la-

to varieg.

7. - - - *imperialis*.

fl. rubro fol. an-

gusto varieg.

8. - - - *imperialis*.

fl. rubro maxi-

mo.

9. - - - *imperialis*.

fl. rubro & Luteo

mixto.

10. - - - *imperialis*.

fl. auranteo &

sulphur. mixto.

11. - - - *imperialis*.

fl. rubro & sul-

phur. mixto.

Petilium R.

Et quelques autres plus ou moins différentes.

P. Ω . +

a.

1. *Corona solis* Virg. humilis fol. lanceolato dentato.

P. Ω +

a.

2. - - - latifol. fl. pleno.

P. η

a.

3. - - - fol. lanceolatis ferratis alternis asperis.

P. η

a.

4. - - - fol. lanceolatis radice repente.

P. Ω +

b.

Coronaria fl. rubro pleno R. *Lychnis Coronaria* B. 3.

F. ♂ +

c.

1. *Coronilla* sive *Coluthea* minima stipula magna B. 1.

F. ♂ +

c.

2. - - - Hispanica frutescens major B. 2.

F. ♂ +

a.

3. - - - vel. *Coluthea* Schorploïdes R. 5. *Emerus* B. 1.

F.

d.

4. - - - Zeylanica argentea tota, B. 4. *indigophora* fol. tomentosis R. pag. 535

P. π +

c.

Cortusa fol. ovatis sessilibus R. 2. *Verbascum humilis alpinum* fl. borragine B. 10.

R.

f. o. x. ff.

Costus, R. *Zedoaria* *Campboram* redolens B. 2.

Co-

Habitus

Culture

A. Ω	b.	Cotinus coriaria B. & R.
F. δ †	d. f.	1. Cotyledon afra fol crasso lacineato flo- sculis aureis B. 10. R. 1.
F. ε †	d. f.	2. - - - afr. frutes. fol. orbiculatis limbus purp. cinctus B. & R. 2.
F. ε †	d. f.	3. - - - eadem fol. utrimque cinereis.
F. Ω †	d. f.	4. - - - afr. frutes. fl. umbellato coccineo B. 8. <i>Crassula</i> R. 1.
F. Ω	d. f.	5. - - - afr. frutes. fol. crutiatis positis fl. ex albo virescente.
F.	d. f.	6. - - - afr. frutes. fol. minoribus crassiss. viridioribus B. 5.
F. Ω	d. f.	7. - - - afr. fol. longo & angusto fl. flave- scente B. 7. C. 23.
F.	d. f.	8. - - - afr. fol. minoribus oblongis atro- viridibus, fl. 6. <i>Crassula</i> R. 6.
F.	d. f.	9. - - - afr. fol. orbiculato limbo purp. & maculis viridibus B. 4.
P. ε	a.	10. - - - major umbellicus veneris B. 1.
F. η †	d. f.	1. <i>Crassula</i> altiss. persol. fl. albo umbellato odorato R. 2. <i>aloë</i> B. 12.
F. η	d. f.	2. - - - fol. subulatis obsoleta tetragonis B. 3 <i>ficoïdes fol. tereti</i> B. 4.
P. η	d. f.	3. - - - fol. subulatis radicatis B. 4.
P. η	d. f.	4. - - - caule flaccida prolifera R. 5. <i>Se- dum</i> B. 24.
P. η	d. f.	5. - - - caule recta fol. amplexicaule cru- tiatis positis.
P. η	d. f.	6. - - - fruticosus fol. vermiculatis.
P. η	d. f.	7. - - - acaulus fol. plano oblongo.
P. η	d. f.	8. - - - parva fol. crasso ovato.
F. η	d. f.	9. - - - arbor fol. oppositis obtusis R. 6. <i>Cotyledon</i> B. 6.
P. η	d. f.	10. - - - acaulos fol. plano crasso longissimo.
P. η	d. f.	11. - - - caulescens fol. plano crasso longiss.
A. II	a.	1. <i>Cratægus</i> fol. subrotundo serrato subtus in- cano B. & R. 1.
A.	b.	2. - - - virg. fol. lanceolatis dentatis acutis. D 3
		3. <i>Cræ-</i>

Habitus

Culture

A.	b.	3. Cratægus virg. fol. lanceolatis dentatis obtusis.
A. II †	a.	4. - - fol. obtusis, bis trifidis, sive Oxycantha dioscorides fl. pleno.
A. II	a.	5. - - fol. obtusis, bis trifidis fructu albo
A. II	a.	6. - - fol. obtusis bis trifidis fructu aureo.
A. II †	a.	7. - - fol. opuli fl. albo fr. oblongo coccineo.
A.	f. o. x. f.	Crescentia, fol. lanceolatis, L. 1. Arbor amer. Cucurbitifera, kallebas boom vulgo.
P. ☞ †	f. o. x. f.	1. Crinum R. Lilio asphodilus am. semper virens maxima C.
P. ☞ †	f. o. x. f.	2. - - L. 3. Lilio asphodilus am. semp. virens minor C.
P. ☞ †	f. o. x. f.	3. - - amer. semper virens minor fl. albo caule purpurascence.
P. Ω	c.	Chritum marinum majus odore apii B. 2.
B. m	a.	1. Crocus sativus B. safran vera.
B. m	a.	2. - - Pyrinæus autumnalis.
B. X	a.	3. - - vernum, d'ont on trouve jusqu'à 22. espèces différentes.
A.	a.	1. Cupressus virg. fol. acacia deciduis.
A. 8	b.	2. - - - meta in fastigium convolutæ B. & R. 1.
A. 8 †	b.	3. - - - Ramos extra se spargens B. 2 vel Fructiferens.
B. X †	b.	1. Cyclamen hyemale fol. orbiculatis, purpurascence flore B. & R. 1.
B. X †	d. *	2. - - - hyeme & vere florens fl. amplo albo odorato Aleppicum dictum.
B. X †	d. *	3. - - - hyeme & vere florens fl. amplo albo odorato basi purpureo B. 2. Aleppicum dictum.
B. X †	d. *	4. - - - eadem basi roseis.
B. m †	a.	5. - - - Autumnalis hederæ fol. fl. carnæo.
B. m †	a.	6. - - - eadem fl. roseo.
B. m †	a.	7. - - - eadem fl. albo.
B. m †	a.	8. - - - Autumnalis fol. bipennis fl. roseo.

Habitus

Culture

- | | | |
|-------|----|---|
| B. ㄨ† | b. | 9. Cyclamen radice anemone fl. purp. minore odorato B. 15. <i>estivum persicum dictum.</i> |
| B. ㄨ† | b. | 10. - fol. orbiculato inferne purpurascence, fl. purp. odorato, <i>estivum veronese dictum.</i> |
| F. ♂ | a. | 1. Cytisus supinus fol. infra & filiquis mollis B. 10. R. 6. |
| A. ㄣ† | c. | 2. - canariensis sempervirens & incanis B. 9. <i>genista</i> R. 6. |
| A. ♂† | a. | 3. - glaber nigricans, cui flores fere spicati B. 7. R. 2. |
| F. ㄣ† | a. | 4. - humilis glaber trifoliatis fl. pulchro aureo spicato. |
| A. ㄨ† | a. | 5. - alpinus fl. racemoso pendulo B. & R. 1. |
| F. ㄣ | a. | 1. Daphne fl. racemosis, R. 1. <i>thymelaea lauri folio sempervirens</i> B. 1: |
| F. ㄣ† | 2. | 2. - floribus sessilibus R. 2. <i>Thymelaea fol. lauri deciduis</i> R. 2. flore purpureo. |
| F. ㄣ | a. | 3. - eadem flore rubro. |
| F. ㄣ | a. | 4. - eadem flore albo. |
| P. ㄣ† | a. | 1. Delphinium Grandiflorum fol. compositus lineari multipartitis L. 4. |
| P. ㄣ† | a. | 2. - virg. altiss. fol. palmatis fl. Cœruleo labi purpureo fimbriato L. 5. |
| P. ㄣ† | a. | 3. - virg. altiss. aconiti glabre fol. fl. cœruleo labi fimbriato. |
| P. ㄣ† | a. | 4. - sybericum humilis fl. cœruleo calcaris, rugosis, |
| P. ㄣ | a. | 5. - platani fol. staphis agrice dictum R. 3. B. 2. |
| A. ㄣ† | a. | 1. Dentaria flore albo. |
| B. ㄣ† | a. | 2. - - flore suave rubente. } <i>Eritbronium</i> R. |
| B. ㄣ† | a. | 3. - - fl. purpureo Rubente. } |
| P. ㄨ | a. | Dentaria fol. omnibus ternatis R. 1. |
| P. ♂† | d. | 1. Dictamnus creticus tomentosus B. 1. <i>Origanum</i> R. 3. |
| P. ♂† | d. | 2. - - montis spili origani fol. B. 2. <i>Origanum</i> R. 2. |
| | | 3. Di- |

Habitus

Culture

P. 5 +

a.

3 Dictamnus albus, R. 1. *Fraxionella fl. albo*
B. 2.

P. 5 +

a.

4. - - - eadem fl. purpurascens B. 3.

F. II

b.

Diervilla accadensis fl. luteo, B. & R.

F. 6 +

d.

1. Digitalis acanthoides Canariensis B. 2.

Gesneria R.

P. 9

a.

2. - - - angustifolia fl. ferrugineo R. 2.
B. 10

R. V

f. o. x. ff.

1. Dioscorea malabarica fol. cordatis R. Ri-
ziphoræ amer. B.

R. V

a.

2. - - - virg. fol. cordatis acuminatis, L. 7.

F. 6 +

d.

1 Diosma fol. linearibus hirsutis R. 1. *spirea*
B. 3.

F. 6 +

d.

2. - - - fol. subulatis acutis R. 2. *spirea fol.*
crutiatis.

F. X +

d.

3. - - - fol. lanceolatis Ciliatis L. 5. fl. albo
umbellato.

F. 6 +

d.

4. - - - fol. linearibus glabris odoratiss. fl.
albo L. 6.

A.

a.

Diospyros R. 2. *Guajacana pishanum virgin.* B.

A.

f.

Dodonæa R. *Staphylodendron fol. lauri* P

V. m +

d.

Dolichos caule perenni lignoso R. 4. *Cara-*
colla vulgo.

F. 6 +

d.

1. Doria af. frutes. crassis & succulentis fol.
B. 8. *otbonna* R. 2.

F. 6

d.

2. - - - af. frutes. coronopi fol. B. 10. *otbon-*
na R. 1.

F. 6 +

d.

3. - - - af. frutes. hederæ terrestri fol. B. 9.
solidago R. 8.

F. 6

d.

4. - - - af. frutes. fol. rigido angusto dentato.

F. 6

c.

Dorychicum monspeliensium B. & R. 1.

F. 6

c.

1. Dracocephalon amer. fl. spicatis R. 2.
Moldavica odorato B. 3.

P. 5 +

a.

2. - - - amer. fl. rubro B. & R. 1.

P. 9

a.

3. - - - sybericum perennis fl. cœruleo.

P. 9

a.

4. - - - virg. fol. lanceolatis serratis fl.
cœruleo.

A.

c.

Draco arbor, *Palma* B. 6. *Cordyline* R. 1.
arbor draconis vulgo.

Dra-

Habitus

Culture

R. Ω †

e. o. x f.

Dracunculoïdes B. *bæmantbus colchicifol* R. 2.

P. 8

e o. ff.

1. Echinomelocactus am. minor, B. 1. *Cactus*

R. 1.

P. 8

f. o. ff.

2. - - - am. major duodecim angularis

B. 2. *Cactus* R. 2. spinis albicantibus.

P. 8

f. o. ff.

3. - - - eadem, spinis rubentibus.

- - - eadem, d'un grandeur extraor-
dinaire.

- - - le meme Croissant sur le Rochers.

P. Ω †

a.

1. Echinopus pumila fol. tenuiter lacineato

B. 4.

P. Ω

a.

2. - - - major B. 1. fl. purpurascence.

F. Ω

d.

Echium afr fruticans fol. pilosis R. 5.

A.

a.

Eleagnus R. 1. *Olea sylvestris* fol. molle incanis.

F. 8 †

c.

1. Elichrysium, orient. frut. fl. Corymbifero,
toto aureo B. 2. *Gnaphalium* R. 11.

F. 8

b.

2 - - - af. fol. Stœchados citrinæ fl. aureo
B. 18. *gnaphalium* R. 15.

F. 8 †

c.

3. - - - af. fol. oblongo tomentoso fl. lu-
teo B. 14. *gnaphalium* R. 18.

F. 8

c.

4. - - - af fol oblongo subtus cano supra
viridi fl. luteo B. 12. *gnaphalium* R. 17.

F. Ω †

d.

5. - - - argent. repens fl. pulchro magno
disco aureo B. 15. *Xeranthemum* R. 2.

P. Ω → †

b.

6. - - - fl. ignescente ex aureo rutilante
B. 3. *gnaphalium* R. 12.

F. Ω †

d.

7. - - - af fruticosum caule alato fol. to-
mentos fl. aureo umbellato.

F. Ω †

d.

8. - - - afr. fructi, fol. parvis crenulatis fl.
albo umbellato.

P. II †

a.

9. - - - montanum fl. suave rubente B. 7.

P. 6

a.

10. - - - mont. fl. rotundiori candido B. 6.

F. Ω

d.

11. - - - fruticosum fl. singulari, *gnaphalium*

R. 13.

P. 8 †

a.

Ephemerum virg. fl. azureo B. 1. *tradescen-*

tia R.

F. Ω

a.

Ephedra uas B. & R.

F. 8

f. o. f.

Epidendron fol. ovatis oblongis R. 3. *Vanil-*

læ vulgo.

E.

Epi-

Habitus

Culture

P. 8+

a.

Epimedium B. & R.

F. X+

c.

Erica afr. arbor. tenui folio B. 8. R. 4.

A. II

a.

1. Euonimus vulgaris fol. variegato.

A. II

a.

2. - - - latifolius B. 2.

A. II

a.

3. - - - vulgaris granis rubentibus.

A. II

a.

4. - - - virg. fol. ovato dentato caule rigido fl. ex viridis rubello.

P. 12

a.

1. Eupatorium urtici fol. canadens. fl. albo B. & R. 2.

P. 12+

a.

2. - - - novæ anglie urtice fol. rugosis fl. albo, amplo.

P. 12

c.

3. - - - caule volubili R. 4.

F. 12+

a.

4. - - - virg. fol. ternis & quaternis fl. purp. L. 9.

P. 12+

a.

5. - - - eadem in omni parte majoribus.

F. 12

c. o. ff.

1. Euphorbium aculeata semi nuda R. 1. fol. nerii latiori B. 11.

F.

f. o. ff. x.

2. - - - acul. triangularis Ramos spargens R. 2. Schaldi d'akalli dista B. 10.

F.

f. o. ff. x.

3. - - - eadem, semper erectum & triangulatum.

F.

c. o. ff.

4. - - - quadrangularis aculeatis R. 3 B. 5. tetragonum & pentagonum.

F. 12

c. o. ff.

5. - - - heptagonum spinis longiss. in apice frugiferis B. 3. R. 4.

F.

c. o. ff.

6. - - - Cereji effigie caulibus crassioribus B. 1.

F.

f. o. ff. x.

7. - - - Cereji effigie caulibus gracilioribus B. 2. R. 5.

F.

f. o. ff. x.

8. - - - Cereji effigie octangularis erectus spinosis.

F. 12+

c. o. ff.

9. - - - polygonum spinosum caule tuberculato B. 4. R. 6.

F. 12+

d. f.

10. - - - caule squamato tuberoso B. 6. fl. albicante.

P. 12+

d. f.

11. - - - eadem capite medusæ effigie.

F. 12+

d. f.

12. - - - caule squamoso minus B. 7. fl. virid.

P. 12+

d. f.

13. - - - eadem capite medusæ effigie.

14. Eu-

Habitus

Culture

- P. δ δ d.f. 14. Euphorbium caule squamoso, in fine rami
se spargens.
- P. δ δ d.f. 15. - - - caule squamoso erecto fl. ex albo
& roseo mixto, B. D. 1. tab. 4. fig. 2.
- P. δ δ d.f. 16. - - - acaulos tuberosus, *Titbymalus tu-*
berosus fol. oblongis cucullatis & planis
B. D. 1.
- P. δ δ d.f. 17. - - - caule squamoso capite medusæ
effigie, humillima ramis proliferis.
- F. δ δ f.o.f. 18. - - - fili forma erecta R. 8. *titbymalus*
B. 28.
- F. δ δ e.o.f. 19. - - - fili forma volubilis.
- F. δ δ e.o.f. 20. - - - fili forma flaccida, R. 9. *Titbyma-*
lus B. 29.
- P. δ δ a. 1. *Fabago belgarum* B. 1. *Zygophyllum* R. 1.
- F. δ δ d. 2. - - - afr. arbor. fl. sulphureo fr. rotundo
B. 2. *Zygophyllum* R. 2.
- F. δ δ d. 3. - - - af. fr. minor fl. flavo magno B. 3.
fructu globoso.
- F. δ δ d. 4. - - - arborescens, fl. aureo amplo.
- E. δ δ d. 5. - - - arborescens ramos extra se spargens,
fl. aureo.
- A. δ δ a. *Fagus fol. atro purpureis.*
- A. δ δ d. 1. *Ferula afr. galbanifera vera, fol. & facie*
ligustices B. 5. *bubon* R. 2. *ferula fruticosa*
sempervirens fol. & caule roseo cæruleo tinctus.
- F. δ δ d. 2. - - - afr. galbanifera fruticosa fol. my-
rhidis B. *bubon* R. 4.
- P. δ δ a. 3. - - - foliolis pinnatifidis R. 4. *ferula gal-*
banifera B. 4.
- F. δ δ d.f. 1. *Ficoïdes* B. *Mesembryanthemum* R.
- F. δ δ d.f. 2. - - - spinis ramosis fl. cæruleo B. 18. R. 3.
- F. δ δ d.f. 3. - - - fl. umbellatis obsoleti coloris R. 4.
- F. δ δ d.f. 4. - - - fol. variegato aspero fl. violaceo
B. 11. R. 5.
- F. δ δ d.f. 5. - - - caule lanuginoso argentea ornato
fl. violaceo B. 8. R. 7.
- F. δ δ d.f. 6. - - - caryophyllæ fol. fl. luteo magno
B. 1. R. 2.
- E. 2 6. Fl.

Habitus

Culture

- | | | |
|--------|------|--|
| P. ♂ † | d.f. | 6. Ficoïdes acaulos crassiss. latiss. & lucidis
fol. fl. aureo ampliss. B. 5. R. 8. |
| P. ♂ † | d.f. | 7. - - acaulos crassiss. latiss. lucidis fl. au-
reo pedunculo brevi B. 7. |
| P. ♂ † | d.f. | 8. - - acaulos fol. crassiss. lucidis diffor-
mibus fl. aureo B. 9. |
| P. ♂ | d.f. | 9. - - acaulos fl. lanceolatis planis crenu-
latis fl. amplo albo R. 11. |
| P. ♂ † | d.f. | 10. - - acaulos bellidi florum R. 13. |
| P. | d.f. | 11. - - eadem in omni parte majoribus. |
| F. ♀ † | d.f. | 12. - - fol. glauco perfoliato apice spinoso
fl. cœruleo B. 17. R. 16. |
| F. | d.f. | 13. - - fol. glauco perfoliato cortice ligno-
so candido tenui B. 15. |
| F. ♂ † | d.f. | 14. - - fol. securi forma, fl. aureo stella-
to, in medio noctu aperto B. 14.
R. 17. |
| P. π | d.f. | 15. - - acaulos fol. semi cylindraceis fl.
aureo R. 23. |
| F. ♂ † | d.f. | 16. - - frutescens fl. phœniceo filamentis
atris, R. 30. |
| P. ♂ † | d.f. | 17. - - acaulos fol. triangulari brevi crasso
dentato, fl. aureo ex calice longiss B. 12. |
| P. Ω † | d.f. | 18. - - humilis fol. triang. longiss. fl. aureo
ad solem aperto. |
| P. Ω † | d.f. | 19. - - humilis fol. triang. prope summi-
tatem dentato fl. luteo R. 12. |
| P. | d.f. | 20. - - humilis fol. varieg. aspero ad api-
cem stella spinosa ornato B. 12. |
| P. π † | d.f. | 21. - - fl. amplo luteo extus linea rubra
longo pictus B. 6. R. 21. |
| F. ♂ † | d.f. | 22. - - noctu florens fl. intus candido ex-
tus phœniceo odoratissimo B. 1. R. 28. |
| F. Ω | d.f. | 23. - - neapolitanum fl. candido B. 15.
R. 22. |
| F. Ω † | d.f. | 24. - - fol. triang. scabro tenui fl. viola-
ceo R. 20. B. 23. |
| P. ♂ † | d.f. | 25. - - fol. longo tenui fl. auranteo B. 5. |
| F. Ω † | d.f. | 26. - - fol. longo tenui fl. coccineo B. 7. |
| | | 27. Fi. |

Habitus	Culture	
F. ♂+	d.f.	27. Ficoïdes fol. longo aspero fl. violaceo B. 24.
F. Ω	d.f.	28. - - fol. tereti glauco apice purp. crasso fl. aureo B. 3. R. 24.
F. ♀	d.f.	29. - - fol. triang. fructu max. eduli B. 3.
F. ♀	d.f.	30. - - fol. triang. ensiformi fl. ampliss. purp. B. 4. R. 18.
F. ♂	d.f.	31. - - fol. triang. acini formi fl. purp. filamentosis B. 5. R. 19.
F. Ω+	d.f.	32. - - fol. triang. dorso lato parum excavato crasso glauco, B. 9. fl. violaceo.
F. Ω+	d.f.	33. - - fol. triang. crasso brevi glauco ad tres margines aculeato B. 21. R. 14.
F. Ω	d.f.	34. - - fol. triang. glauco breviss. margine non spinoso B. 22. fl. violaceo.
P. Ω	d.f.	35. - - fol. tereti procumbens fl. violaceo B. 6.
F. π+	d.f.	36. - - fol. triangulari erecta fl. luteo magno B. 7 R. 27.
P.	d.f.	37. - - repens fol. triangulari longissimo.
F. Ω+	d.f.	38. - - fruticosus fol. tereti fl. suave rubent.
F. Ω+	d.f.	39. - - fruticosus, fol. tereti longiss. fl. aureo amplo.
F. Ω	d.f.	40. - - frutescens fol. tereti viridi fl. albo.
P. Ω	d.f.	41. - - caule infirmi fol. tereti fl. albo umbellato.
P. Ω	d.f.	42. - - caule infirmi fol. triquetris fl. violac.
F. Ω+	d.f.	43. - - humilis fruticosus, fol. triang. brevi fl. pulchro violaceo.
P. Ω	d.f.	44. - - caule infirmi fol. calendulae fl. aureo B. 3.
A.	f. o. x.	1. Ficus Nymphaea fol. R. 1.
A.	e. o.	2. - - malabarensis fol. cuspidato B. 7 R. 3.
A.	c. o.	3. - - bengalensis fol. subrotundo B. 8. R. 4.
A.	e.	4. - - bengal. fol. lanceolatis integerrimis R. 5.
A.	b.	5. - - fructu maximo purp B. 1.
A.	b.	6. - - fructu albo B. 2.
P. Ω	a.	1. Filupendula fol. pinnatis R. & B. 1.

Habitus

Culture

P. Ω †

a.

2. Filipendula ut preced, fl. pulcherrim. pleno.

P. Ω

a.

3. - - foliolo impari trifido R. 2. *Ulmaria* B. 1.

P. Ω †

a.

4. - - eadem fl. pulcherrimo pleno.

P. Ω

a.

5. - - fol. ternatis R. 3. floribus amplis candidis *Hypocacuanba dicta*.

A. II

a.

Frangula B. 1. Alnus nigra baccifera.

A. III †

a.

Fraxinus Caroliniensis Plumosis.

B. II

b.

Fritularia radice rotundo R. 1. *Lilio frittular*.

B. II †

a.

Fritularia, d'ont on peut avoir une tres belle Collection d'environ 100. especes plus ou moins differentes, étant leur noms annuellement inferes en le Catalogue des oignons.

B. 8 †

c.

1. Fumaria scapo nudo R. 1.

P. 8 †

a.

2. - - sempervirens & florens, fl. albo B. 5.

P. 8 †

a.

3. - - eadem fl. luteo B. 6.

B. 8

a.

4. - - bulbosa radice cava major fl. albo B. 9. R. 2.

R.

f. o. x. ff.

Galanga major B.

A. II

b.

1. Gale caroliniensis baccifera B. 1. *Myrica* R. 2.

F. II

a.

2. - - odoratissima septentrionalis B. 2. *Myrica* R. 1.

P. Ω †

a.

1. Galega fl. candido B. 2.

P. Ω †

a.

2. - - fl. cœruleo B. 1.

F. 8

d.

Galenia R. frutex afr. fol. rosmarini odorato B. pars 2. pag. 267.

P. 8

a.

1. Galeopsis alpina betonice fol. fl. variegato B. 14.

P. 8 †

a.

2. - - fol. urticae fl. luteo varieg. B. 10.

P. Ω †

a.

1. Galium fol. pluribus linearibus fl. luteo B. & R. 1.

P. Ω †

a.

2. - - fol. nervosis fl. albo R. 8 *Crutiata* B. 1.

P. Ω

a.

3. - - fol. nervosis parva fl. albo, *Crutiata* B. 2.

F. Ω †

b.

1. Genista juncea vel hispanica fl. luteo odorato B. 1. *spartium* R. 1.

2. Ge.

Habitus	Culture	
F. Ω†	b.	2. Genista ut preced. fl. pulcherrimo pleno M.
F. Ω†	a.	3. - - tinctoria germanica B. & R. 1.
F. Ω†	a.	4. - - tinctoria germanica latifolio M. 6.
F. Ω	b.	5. - - lusitanica M. 4. amozella dicta.
P. η†	a.	1. Gentiana major lutea B. & R. 1.
P. η†	b.	2. - - latifolia fl. punctato B. 7. <i>Syriaca</i> R.
P. II†	a.	3. - - alpina magno flore B. 4. R. 5.
P. Ω†	a.	4. - - floribus confertis terminatricibus R. 4.
P. Ω†	d.	1. Geranium afr. frutesc. alchimillæ hirsuto fol. cum fimbriis purp. fl. rubro magno B. 17. R. 24.
F. δ†	d.	2. - - afr. alchimillæ fol. floribus rubicundis B. 2.
F. δ†	d.	3. - - eadem fol. Eleganter varieg B. 3
F. δ†	d.	4. - - afr. alchimillæ fol. fl. rubello purpurascente.
F. δ†	d.	5. - - eadem fl. Elegantissimo kermosino.
F. δ†	d.	6. - - eadem fol. ex pallide aurco variegat.
F. δ†	d.	7. - - afr. fol. planis fl. Elegantiss. kermosino B. 4.
P. δ†	d.	8. - - afr. Myrhides fol. fl. magno striato B. 9.
P. δ†	d.	9. - - afr. fol. Coriandri fl. magno striato B. 8. R. 26.
F. δ	d.	10. - - afr. noctuolens tuberosum & nodosum, aquilegiæ folio B. 15. R. 27.
F. δ	d.	11. - - afr. fol. crasso & glauco B. 16. R. 19.
F. δ	d.	12. - - afr. fol. inferiori asari superiori staphidis agrice B. 5. R. 27.
F. δ	d.	13. - - afr. fol. cordatis lobatis crenatis pilosis B. 6. R. 21.
P. δ	d.	14. - - afr. fol. molli crasso odoratissimo B. 22. R. 29.
F. Ω†	d.	15. - - afr. alcea fol. fl. Coccineo fulgidissimo R. 24. R. 23.
B. η	d.	16. - - afr. noctuolens vitis fol. B. 14. R. 18.
		17. Ge-

Habitus

Culure

P. ♂

d.

17. Geranium af. alcea fol. fl. albo semperflo-

rens B. 25.

B. m

d.

18. - - - af. noctuolens myrhydus fol. radice
tuberoso fl. albicante M. 36.

B. m

d.

19. - - - af. noctuolens anemone fol. radice
tuberoso B. 11. R. 17. fl. ex viridi rubello.

B. m

d.

20. - - - af. noctuolens pastinacea fol. B. 12.
flore pallido.

F. ♂

d.

21. - - - af. fol. malvæ lacineato, odore
instar melissæ B. 7.

P. ♂ +

a.

22. - - - hematodes fl. variegato B. 34.

P. ♂

d.

23. - - - afr. fol. orbiculatis palmatis incis
pilosus fl. albo B. 10. R. 30.

B. Ω

d.

24. - - - afr. tuberosum apii fol. fl. ex pal
lide luteo striis purp. notato.

P. ♂ +

a.

25. - - - sanguineum maximo flore B. 32.
R. 1. fl. cœruleo.

P. ♂ +

a.

26. - - - eadem fl. pallido.

P. ♂ +

a.

27. - - - batrachoïdes fl. cœruleo B. 27.

P. ♂ +

a.

28. - - - batrachoïdes fl. varieg B. 29.

P. ♂ +

a.

29. - - - phœum fl. ferrugineo petalis planis.

P. ♂ +

a.

30. - - - eadem fl. pallide rubello.

B. Ω +

b. *

1. Gladiolus fl. carneis maculam Rhomboi
deam purp. inscriptus B. 5. R. 1.

Ω

b. *

2. - - - af. fl. sulphureo.

c. *

3. - - - af. caule maculato.

Ω +

c. *

4. - - - af. florem calice lutescente petalœ
demidio purpureis.

Ω +

c. *

5. - - - af. fl. amplo albicante.

Ω +

c. *

6. - - - af. fl. amplo cinereo.

c. *

7. - - - af. omnium maximum.

Ω

b.

8. - - - af. fl. purpureis.

Ω

b.

9. - - - maximus indicus.

Ω +

b.

10. - - - bisantinum major fl. purp. M. 3.

Ω

b.

11. - - - fl. carnœo.

Ω

b.

12. - - - fl. albo.

Ω

b.

13. - - - fl. purpureo.

Ω +

c. *

14. An, Gladiolus afr. max. lilaci colore.

15. An,

Habitus	Culture	
B. Ω +	c. *	15. An, Gladiolus af. minor liliaci colore.
R. ✓ m +	f. o. x. ff.	Gloriosa R. Metbonica malabarorum B. five li- lium superbum Zeylanicum.
F.	f. o. x.	Gossypium arboreum R. 2. Xylon B. 1.
P. m	a.	1. Gramen latiore variegato folio.
P. m	a.	2. - - - angustiore variegato folio.
V.	e.	1. Granadilla surinamensis fol. oblongo fer- rato Passiflora R. 1.
V.	f. o. x.	2. - - - fol. tricuspidi obtuso & oculato B. 9. Passiflora R. 2.
V. m + +	b.	3. - - - pentaphyllos fl. cœruleo B. 1.
V. m + +	b.	4. - - - pentaphyllos latioribus fol. fl. cœ- ruleo magno B. 2. Passiflora R. 4.
R. m +	e. x.	5. - - - triphyllos fl. roseo Clavato B. 3. Passiflora R. 5.
R. ✓ m + +	a.	6. - - - fol. tricuspidi fl. parvo flavescente B. 4. Passiflora R. 7.
V. m + +	b.	7. - - - pentaphyllos fl. albo magno B. 7.
V.	e. o.	8. - - - fol. amplo tricuspidi fructu olivæ formæ, Passiflora R. 6.
V. m	c.	9. - - - triphyllos glabro fl. parvo gemino.
V.	e. o.	10. - - - fol. hastato, fl. ex purp. & luteo variis Passiflora R. 8.
V.	e. o.	11. - - - triphyllos fl. luteo fructu purpureo.
A. II	ia.	Grossularia virgin. fructu spinoso, Ribes L. 8.
A.	g.	Guajabara fol. oblongis, R. pag. 534. Uvife- ra hort cliff. polygonum L. 26.
F.	f.	Guajacum lentisci folio L. 1. lignum sanctum vulgo.
A.	f.	1. Guajava alba dulcis B. 1. } Pesidium R.
A. fl. B. f.		2. - - - rubra acida B. 2.
A. Ω + +	d.	Guidonia ulmi fol. fl. roseo B. Grewia R. 1.
B. = +	d. *	Hæmanthus afr. fol. linguæ forma scapo uni- flora B. & R. 1.
F. m	c. o.	Halleria fl. ruberrima R. Caprifolium B. 5.
F.	f.	Hæmatoxylon R. lignum campechianum.
V.	a.	Hedera communis fol. Eleganter variegatis B. 5.

Habitus

Culture

P. Ω †

e.

1. Hedyсарum fol. simplicibus ovatis R. 1.

P. Ω †

b.

2. - - - clypeatum fl. suave rubente B. 3.
R. 3.

P. Ω †

b.

3. - - - clypeatum fl. albido B. 4.

P. Ω

d.

4. - - - af. trifoliatum hirsutum.

P. Ω †

a.

Helenia fol. decurrentibus, R. *Corona folis*
B. 18.

P. Ω †

c.

Heleanthemum orient. oleæ fol. fl. albo.

P. Ω

a.

1. Helleborine latifol. montanum B. 1. *Serapias* R. 1.

P. Ω

a.

2. - - - angustifol. fl. purpurascens B. 4.

P. Ω

a.

1. Helleborus niger scetidus B. & R. 1.

P. X

a.

2. - - - niger fl. viridi B. & R. 2.

P. Ω †

a.

3. - - - fl. albo vel roseo B. & R. 3.

P. Ω †

a.

4. - - - fl. luteo globoso R. 5. *belleborii*
ranunculus B.

P. X †

a.

1. Hepatica fl. cœruleo R. 1.

P. X †

a.

2. - - - fl. cœruleo pleno B. 2.

P. X †

a.

3. - - - fl. rubro pleno B. 4.

P. X †

a.

4. - - - fl. albo vel Carnæo B. 5. & 6.

F. Ω †

d.

1. Hermannia fol. oblongo serrato B. 1. R. 3.

F. Ω †

d.

2. - - - fol. oblongo serrato latiori
B. 2. R. 1.

F. Ω †

d.

3. - - - fol. ibici hirsuto fl. aureo B. 4.
R. 2.

F. Ω †

d.

4. - - - eadem fl. primo aureo deinde
purpureo rubello.

F. Ω †

d.

5. - - - uvæ Crispæ fol. fl. spirale sulc.
B. 3 R. 5.

F. Ω †

d.

6. - - - lavendula latiori folio B. 7. R. 4.

B. Ω †

b.

Hermodactylus fol. quadrangularis B. *iris* R. 12.

A.

f. e. x.

Hernandia amplo hederæ fol. umbilicato R.
pag. 535.

P. Ω

b.

1. Hibiscus populi fol. fl. roseo R. 1. *ketmia*
B. 7.

A. Ω †

e. c.

2. - - - fl. miniat. Clauso B. 2.

A.

c.

3. - - - chinensis fl. simplici R. 3. *ketmia*
B. 5.

4. Hi-

Habitus

Culture

A.

c.

4. Hibiscus chinensis fl. pleno ketmia B. 6.
rosa chinensis dicta.

A. x†

e.

5. - - - papaja fol. fl. magno flavescente
fundo purpureo, ketmia B. 12.

F. δ

d.

1. Hieratium pulchrum ramosum lanuginosum
R. 3. B. 10.

P. δ†

a.

2. - - - flore coccineo R. 9. B. 31.

P. ∞

a.

3. - - - alpinum maculatum fl. luteo.

P. ∞

a.

4. - - - hortense altiss. fol. lanceolatis
dentatis fl. luteo.

F. ∞

a.

Hypophea R. Rhamnoïdes salicis fol. B.

P. ∞

a.

Hordeum virg. perenne.

A.

f. o. x.

Hura abutili fol. R.

R. ∞

a.

Hydrophyllon morini B. & R.

F. δ†

d.

Hyocyamus Creticus luteo maior B. 6. R. 3.

P. ∞†

d.

1. Hypericum orient. fl. magno B. 12. R. 7.

P. ∞ →

a.

2. - - - ascyron dictum caule quadrangu-
lato B. 2. R. 4.

F. ∞

a.

3. - - - foetidum frutescens B. 11. R. 9.

F. δ†

c.

4. - - - frutes. canar. multiflorum B. 10. R. 8.

F. ∞†

a.

5. - - - fructu baccato R. 3. *androsimum*
maximum B.

P. ∞†

a.

6. - - - amer. magnum banisteri.

P. ∞†

b.

1. Hyssopus arabum rubro flore B. 4.

P. ∞†

a.

2. - - - spicis interruptis, R. 1. *Ruyfchiana*
fl. amplæ cœruleo B.

B. ∞

b.

1. Hyacinthus Corollis campanulatis sexparti-
tis R. 3. flore albo B. 5.

B. ∞

a.

2. - - - eadem fl. carnæo B. 2.

B. ∞

a.

3. - - - eadem fl. cœruleo B. 1.

B. δ†

d.*

4. - - - fl. oblongo suave rubento B. 13.

B. ∞†

b.

5. - - - floribus paniculatis monstrosis R. 5.

B. ∞

b.

6. - - - muscari fl. ex cœruleo virescente
B. 2. R. 4.

B. ∞

b.

7. - - - muscari fl. ex luteo virescente B. 3.

B. X†

a.

8. - - - stellatis fl. cœruleo B. 1. } Scilla

B. γ†

a.

9. - - - stell. fl. dilute cœruleo B. 2. } R. 4.

F. 2

10. Hya-

Habitus

Culture

B. v +

a.

10. Hyacinthus stell. fl. carnæo B. 3.

B. v +

a.

11. - - - stell. fl. ex albido B. 4.

B. v +

a.

12. - - - stell. fl. suave rubento B. 6.

B. v +

a.

13. - - - stellatis fl. obsoleto cœruleo B. 7.

B. v +

b.

Hyacinthus, d'ont on peut avoir annuellement le Catalogue, avec leur noms Couleurs & juste prix d'une Collection extrêmement grande, de plus belles & plus nouvelles especes.

F. n +

b.

1. Jacobœa maritima minor B. & R. 7.

F. n +

b.

2. - - - eadem fol. Eleganter variegatis.

F. n

b.

3. - - - maritima latifolio B. 8.

R. n +

c.

Jalappa vera offic. fl. albo tubo longissimo fructu rugoso.

F. n +

b.

1. Jasminum vulgatius fl. albo odorato B. & R. 1.

F. n +

b.

2. - - - eadem fol. ex auro variegato.

F. n w +

d.

3. - - - hispanica fl. albo magno externe rubente B. 2.

A. n w +

c.

4. - - - azoricum trifoliatum fl. albo odorato B. 7.

A. n w +

c.

5. - - - eadem fol. variegatis.

F. v +

b.

6. - - - humile luteum B. 3. R. 5.

F. v +

c.

7. - - - fol. alternis fl. luteo odorato B. 4.

A. v +

c.

8. - - - indicum flavum odoratum B. 5. R. 4. majus.

A. v +

c.

9. - - - eadem minus fructiferens.

F. v

d.

10. - - - afr. ilicis fol. fl. albo solitario B. 6. *Lantana* R. 3.

F. v +

c.

11. - - - arabicum fol. Limonis conjugatis fl. albo odoratissimo B. 9. *Nyctantes* R.

F. n

c.

12. Jasminoïdes fol. Pishaminis flore virescente noctu odoratissimo, *Cestrum* L. 1.

F. n +

c.

13. - - - laureolæ fol. fl. candido, interdum odorato, *Cestrum* L. 2.

F. n +

c.

14. - - - fol. lauri Alexandrini fl. amplo virescente noctu odoratissimo.

A. v

c.

1. Jatropha amer. gossipi fol. R. 1. *Ricinoïdes* B. 1.

2. Ja-

Habitus

Culture

- A. 10 + f.f. 2. Jatropha amer. fol. multifido B. 2. Ricinoides B. 2.
- A. 8 + f.f. 3. - - - amer. lactescens & urens fl. albo R. 3.
- F. 10 + f.f. 4. - - - amer. floribus purpureis R. 5.
- F. 8 + b. 1. Iberis fol. cunifoliformibus R. 1. thlaspidium fruticosum semperflorens B. 1.
- F. 8 + c. 2. - - - eadem fol. Eleganter variegato B. 2.
- P. 11 + a. 3. - - - fol. linearibus R. 2. thlaspi sempervirens B. 7.
- A. b. 1. Ilex Cocciglandifera aculeato B. 1. quercus R. 8.
- A. c. 2. - - - foliis lanceolatis.
- A. b. 3. - - - Cocciglandifera fol. lato dentato. } quercus sem-
- A. b. 4. - - - Coccigl. fol. angusto dentato. } pervirens.
- P. 5 a. Imperatoria B. & R.
- F. 8 f.o. Indigophora vel indigo amer. fruticoso siliquis falcatis M. 2.
- R. 5 + b. 1. Iris Corollis barbatis, R. 1. Iris susiana fl. maximo B. 7.
- B. 7 + a. 2. - - - acaulos R. 13. Xiphium persicum fl. variegato B. 1.
- P. 9 b. 3. - - - alba florentina B. 6.
- P. 5 + a. 4. - - - latifolia petalis ex atro purp. & albo striatim B. 4.
- P. 5 + a. 5. - - - latifolio petalis repandis atropurp. vietis, Erectis obsolete purpurascen- bus B. 8.
- P. 8 a. 6. - - - humilis fl. purpureis, B. 21. } Chamae-
- P. 8 + a. 7. - - - humil. fl. variegato B. 23. } ris dicta.
- P. 8 a. 8. - - - humil fl. albescente B. 24.
- P. 9 a. 9. - - - angustifolia, caeruleo flore B. 17.
- R. 9 a. 10. - - - angustifolia fl. caeruleo striato B. 18.
- R. 9 + a. 11. - - - angustifolia fl. purp. utrimque variis B. 19.
- R. 5 + a. 12. - - - angustifolia bulbosa sive hispanica fl. pleno.

Iris angustifolia, bulbosa, *Xiphium* B. *iris hispanica* vulgo, d'ont on trouve 40. especes plus ou moins differentes.

Iris latifolia bulbosa, *iris* R. 14. *iris* anglia bulbosa vulgo, d'ont peut avoir environ 60. especes, extremement belles, & plus ou moins differentes, d'ont on trouve le noms Couleurs & prix mentionnez dans le Catalogue des oignons a fleurs.

1. *Juglans* amer. nigra fructu oblongo profundissimo insculpto M. 6.

2. - - - - - amer alba, fructu minore suavissimo.

1. *Juniperus* virg fol inferioribus *Juniperi* num, superioribus cupressam referentibus R. 3. B. 5.

2. - - - - - virg. fol. toto juniperino B. 4.
Cedrus nigra vulgo

3. - - - - - Bormudianus B. & R. 5.

1. *Ixia* L. 1. R. 1. *gramen tomentosum pumilum* afr.

2. - - - - - L. 2. flore rubro & luteo Eleganter punctato.

3. - - - - - flore aureo maculis purpureis insignito.

4. - - - - - flore sulphureo ad tres petalos maculat.

5. - - - - - flore albo, rubro & atro notato margine fimbriato.

6. An, *ixia* caule bulbifera, fl. albo amplo.

7. - - - - - caule bulbifera fl. albis amplo extus violaceis

8. - - - - - caule bulbifera fl. albis amplo extus cinereis.

Kalmia fol. lanceolatis integerrimus L. 2.

Kæmpheria R. *Aro orchis tuberosa* T. 2.

1. *Kiggelaria* mas R. *Euonimus affinis* et bio-

2. - - - - - scemina R. *picus* B.

1. *Kleinia* caule Carnoso petiola truncatis obvallatis, R. 4. *Cacalia* L. 1.

2. - - - - - fol. lanceolatis planis R. 1. *Cacalia* L. 3.

3. Klei-

Habitus	Culture	
F.	d.f.	3. Kleinia fol. carnosis planis oblongis ovatis R. 2. <i>Cacalia</i> L. 2. <i>Anteuphorbium</i> B.
F. \equiv †	d.f.	4. - - fol. carnosis lanceolatis R. 3. <i>ca-</i> <i>calia</i> L. 4. <i>Senecio</i> C. tab. 40.
F.	d.f.	5. - - fruticosa fol. carnosis vermiculatis.
P. \equiv †	d.f.	6. - - pumila fol. carnosis ovato oblongo.
P. \equiv	a.	7. - - caule herbaceo fol. subcordato <i>Ca-</i> <i>calia</i> L. 9. <i>nardus americana</i> procerior.
P. \ominus †	a.	<i>Lactuca</i> perennis humilis fl. cœruleo T. R. 4.
P. δ	a.	<i>Lamium</i> fl. albo fol. variegato.
P. \ominus	a.	<i>Laserpitium</i> lucidum B. 8.
R. \vee Ω †	a.	1. <i>Lathyrus</i> perennis fl. purpureo majore B. 1.
R. \vee Ω	a.	2. - - perennis fl. purpureo minore B. 2.
R. \vee Ω	a.	3. - - perennis vicia fol. fl. luteo B. 7.
A. m	c.	1. <i>Laurus</i> indica vel americana B. 1. R. 2. <i>Cinnamomum spuria</i> vulgo.
A.	c.	2. - - Caroliniensis fol. acuminatis baccis cœruleis R. 5.
A.	c.	3. - - latifolio B. 2. <i>Laurus nobilis</i> vulgo.
A. II	b.	4. - - vulgaris B. 4. R. 1.
A.	c.	5. - - fol. Eleganter variegato B. 5.
A. II	b.	6. - - foliis undulatis B. 8.
A. II	c.	7. - - tenui folio B. 9. <i>Baccifera dista</i> .
A. II	b.	8. - - Romanus vel Racemiferus.
A.	b.	9. - - cerasus fol. variegato.
A.	a.	10. - - cerasus lusitanica minor, <i>padus</i> R. 3.
P. \ominus	a.	1. <i>Lavandula angustifolia</i> fol. fl. albo B. 4.
F. δ †	c.	2. - - fol. pinnatis dentatis R. 3. <i>stæchas</i> B. 2.
F. δ †	c.	3. - - fol. lanceolatis spica comosa R. 4. <i>stæchas</i> B. 1.
F. m †	c.	1. <i>Leonurus siederitidis</i> fol. fl. Phœniceo B. & R. 1. <i>phlomis</i> L. 12.
F. Ω †	d.	2. - - nepetæ fol. fl. phœniceo B. 2. <i>phlomis</i> L. 11.
A. II	c.	1. <i>Lentiscus vulgaris</i> mas B. 2. } <i>pistacia</i>
A. II	c.	2. - - vulgaris fœmina B. 1. } R. 3.
A. II	c.	3. - - omnium minimum.

1. *Leu-*

Habitus

Culture

B. \times +	a.	11.	Martagon vulgo.	[Lilium flavum fl. flavo maculis nigris B. 14.	Lilium R.	
B. Ω +	a.	12.		- - floribus reflexis albis B. 9		
B. Ω +	a.	13.		- - florib. reflex. albis pun- ctatis B. 8.		
B. Ω +	a.	14.		- - florib. reflex. purpureo pleno M. 14		
B. Ω +	a.	15.		- - floribus reflex. luteis pun- ctatis.		
				Et plusieurs autres jusque a 30. especes plus ou moins diffe- rentes d'ont ou trouve les noms specifique dans le Cata- logue des oignons.		
R. Θ +	a.	1.	Lilio Asphodelus luteus B. 1.			
R. Θ +	a.	2.	- - asphodelus puniceus B. 2. <i>bemora-</i> <i>callis</i> R. 1.			
R. Θ +	a.	3.	- - asphodelus minor fl. albo magno, <i>liliastrum</i> B. <i>bemoracallis</i> R. 2.			
B. Θ +	b.	1.	Lilio Hyacinthus fl. cœruleo B. 1. <i>Scilla</i> R. 2.			
B. Θ +	b.	2.	- - Hyacinthus fl. purpureo maximo.			
P. δ +	d.	1.	Limonium peregrinum fol. asplenī B. 7. <i>statice</i> R. 3.			
F. δ	d.	2.	- - lignosum gallam ferens & non fe- rens B. 6. <i>statice</i> B. 3.			
P. Ω + +	a.	3.	- - - maritimum majus B. 1.			
P. Ω + +	c.	4.	- - - af. caule ramoso, <i>statice</i> R. 5.			
P. δ	d.	5.	- - - af. parvum fol. rosmarini tenuiore.			
P. Π	a.	1.	Lingua cervina multifido fol. B. 10.			
P. Π	a.	2.	- - cervina undulato fol. B. 5.			
P. Π	a.	3.	- - cervina fol. maximo supra in am- plas lacineas foliaceas explicato B. 15.			
P. Θ	c.	1.	Linum perennes majus cœruleo B. 6.			
P. δ +	c.	2.	- - perennes luteum B. 7. R. 3.			
A.	c.		Liquidambar R. acer virgin. odoratum R. 6.			
P. Θ	a.		Lythospermum erectum fol. Elegantiss. varieg.			
P. Ω +	b.	1.	Lobelia maxima coccineo spicato flore R. 1. <i>Rapuntium</i> B. 1. <i>floscard. vulga.</i>			

G

2. Lo-

P. Ω †

b.

2. Lobelia omnium max. fl. spicato Coc.
cineo.

P. Ω

a.

3. - fl dilute cœruleo R. 4. Rapun-
tium B. 2.

P. Ω

d.

4. - af. minus fl. violaceo Rapun-
tium B. 4.

F. Ω

a.

1. Lonicera floribus capitatis R. 1

F. Ω †

b.

2. - fol. supremis connatis, inferiori-
bus petiolatis, R. 2. periclymenum virg.
flore Coccineo sempervirens & florens B.

A. Ω

a.

3. - fructu rubro R. 8. Chamæcerasus
fructu gemino rubro B. 1.

A. Ω

a.

4. - vel chamæcerasus fructu gemino
nigro.

A. Ω

a.

5. - vel chamæcerasus fructu gemino
cœruleo.

P. Ω

a.

1. Lotus villosa fl. glomerato B. & R. 1.

F. Ω †

d.

2. - cretica argentea fl. luteo B. & R. 3.

F. Ω †

d.

3. - angusti fol. fl. luteo purpurascenti-
bus ex insula st. Jacobi B. 14. R. 6.

P. Ω

a.

Lunaria siliqua globosis R. 2.

P. Ω †

a.

Lupinus virg perennis fl. cœruleo L. 1.

P. Ω

a.

1. Lupinastrium fl. albo. } trifolium L. 9.

P. Ω

a.

2. - fl rubro.

P. Ω †

b.

1. Lychnis quæ behen album fl. pleno B. 29.

P. Ω †

b.

2. - ocenastrum fl. albo pleno B. 18.

P. Ω †

a.

3. - chalcedonica fl. pleno miniato B. 12.

P. Ω

a.

4. - saponaria fl. pleno B. 36.

P. Ω

a.

5. - viscosa angusti fol. fl. pleno B. 41.

P. Ω †

a.

6. - flore lacineato pleno B. 47.

F. Ω

c.

1. Lycium fl. ex albo purpurascente R. 1.
Rhamnus B. 2.

F. Ω

c.

2. - fl. ex atro purp. R. 2. Rhamnus
B. 8.

F. Ω

c.

3. - fol. linearibus latis, fl. purpureo.

F.

c.

4. - fol. linearibus tenuiore.

F.

c.

5. - fol. lanceolatis.

P. Ω †

b.

1. Lyfimachia sempervirens fl. blattariæ B. 3.

2. Ly-

Habitus

Culture

P. Ω

a. 2

2. *Lythymachia* fol. ovato-acutis quaternis R. 9.
pag 529.

P. π†

a.

Lytrum vulgare purpureum R. 1. *Salicaria* B. 1.

A.

c.

1. *Magnolia* fol. ovato lanceolato L. 1.

A.

c.

2. - - fol. ovato oblongo L. 1. B.

F. Ω

d.

1. *Majorana* nobilis odoratiss. B. 1. *origanum*
R. 5.

P. Ω

a.

2. - - rotundi folio odorato B. 2.

P. π†

b.

1. *Malva*, rosea fl. pleno subluteo B. 13.

P. Ω†

a.

2. - - virginiana fl amplo rubro.

P. π

b.

Mandragora fructu aureo rotundo B. 2. R. 1.

R. π

g o. x. f.

Marantha Cannacori folio R.

F. δ

b.

Marrubium fol cordatis subrotundis R. 2.

R. m†

g. o. x. f.

Martinia fol serrato R.

F. Ω

b.

1. *Marum* Syriacum B. 1. *teucrium* R. 2.

F. Ω

b.

2. - - syriacum foliis quasi maculatis.

P. δ†

b.

Matricaria orient. fol. matricariæ vulgaris
fl. plenissimo.

P. Ω

b.

Massichina B. *thymus* R. 3.

A. δ†

c.

1. *Medicago* frutescens incana B. 1. R. 6.

F. δ

c.

2. - - caule procumbente villoso legumi-
nis Cochleatis spinosis, R. 2. *medica* B 1.

P. δ

a.

3. - - caule prostrato flavo flore L. 6.

F. Ω†

b.

1. *Mellanthus* af. major B. & R. 1.

F. Ω†

d.

2. - - af. minor B & R. 2.

F. Ω

a.

1. *Menispermum* canadense scandens R. 1.

A.

b.

2. - - tartaricum fol. simplicibus lan-
ceolatis dentatis.

F.

c.

1. *Mentha* arborea fol. ovato crenato R. 8.
beliotropium B. 2.

R. Ω

a.

2. - - fol. argenteis varieg.

R. Ω

a.

3. - - fol. ex aureis varieg.

F. δ

c.

Mercurialis fruticosa incana testiculati R. 3.

F. π†

g. o. x.

1. *Mimosa* frutescens spinosa sensibilis B. 2.
R. 4. *Herba viva sensitiva* vulgo.

F. π

g. o. x.

2. - - frutescens tenui acacia fol. sensibilis
B. 6.

Habitus

Culture

F. ♂

f. o. x.

3. Mimosa frutesc. spuria non sensibilis B. 7.
R. 12.

P. Ω

a.

Miliun flosculis confertis R.

F.

d.

Molle Clusii B. Scinus fol. pinnatis L. 2.

B. ♂

a.

1. Moly major fl. albo, Allium B. 7.

B. ♂

a.

2. - - major fl. purpureo.

B. ♂

a.

3. - - minor fl. luteo, Allium R. 1.

P. Ω +

a.

1. Monarda fl. purpureo R. 1. Clinopodium B. 5.

P. Ω +

a.

2. - - fl. coccineo L. 2.

P. Ω

a.

3. - - fl. albo.

P. Ω +

d.

4. - - fl. luteo R. 2. Clinopodium virg. floribus amplis luteis purpureo maculato.

F.

g. o. x. f.

1. Musa, pisang maxima vulgo M. 1.

F.

g. o. x. f.

2. - - pisang, caule maculis nigris M. 2.

F.

d.

1. Myrica fol. subcordatis ferratis R. 4. arbuscula afr. fol. solitario B. pars 2. pag. 263.

F.

c.

2. - - fol. oblongis oppositis sinuatis R. 3. Laurus querci fol. africana, B. 11. folio glabri.

F.

c.

3. - - eadem fol hirsutis.

A.

b.

4. - - fol. lanceolatis utrimque acuminatis ferratis M. 3.

F.

b.

5. - - fol. lanceolato dentato obtuso.

P. ♂

a.

1. Myrrhis perennis alba fol. hirsuto sem. aureo T.

P. ♂ +

a.

2. - - perennis luteo radice cauce T.

A.

d.

1. Myrtus Zeylanica B. 13. L. 4. Myrtoïdes R.

A. Ω +

c.

2. - - balsamica fol. mali granatæ B. 2.

A. Ω

c.

3. - - caule rubente odore citri B. 3.

A. Ω +

c.

4. - - latifolio romano B. 4.

A. Ω +

c.

5. - - latifolio flore pleno B. 7.

A. Ω +

d.

6. - - latifolio bætica B. 5.

F.

d.

7. - - bætica fol. parvis rotundioribus.

A. Ω +

c.

8. - - buxi ampliori folio B. 8.

A. Ω

d.

9. - - buxi breviori folio, bouquet vulgo.

A. Ω

c.

10. - - minor vulgaris B. 9. tarentina vulgo.

A.

d.

11. - - eadem fol. Elegantiss. variegatis

12. Myr-

Habitus

Culture

A. 12 +

d.

12. Myrtus foliis minimis & mucronatis,
Rosmarini folio vulgo.

A. 13 +

c.

13. - fol. mucronatis flosculis rubris can-
didis *Media vulgo.*

A. 14 +

d.

14. - eadem fol. ex albo eleganter varieg.
B. 12.

A.

c.

15. - fol. angustis & mucronatis per in-
tervallæ cristatis.

A. 16 +

c.

16. - fol. amplissimis binis vel ternis,
Lauri folio vulgo.

A. 17 +

c.

17. - eadem in apice aureis.

A.

c.

18. - fol. rotundiori.

A. 19

c.

19. - fol. acutiori reflexis.

A. 20 +

c.

20. - fol. acutis, multiflorum, ex semine
lauri folio degener.

B. 1 +

b.

Narcissus orient. fl. pleno gemello.

B. 2 +

b.

Narcissus orient. polyanthos, Narcisse a bon-
quets, tassettes, ou Troisnarcisse, d'ont on
trouve un assortiment extremement belle
environ de 60. especes, étant leurs noms
& Couleurs specifiés en le Catalogue des
oignons.

B. 1 +

a.

1. Narcissus junci fol. fl. tubam referente B. 4.

B. 1 +

a.

2. - parvus totus luteus B. 1.

B. 1 +

a.

3. - eadem quadruplo minore sive nana
minima.

B. 1 +

b.

4. - parvus fl. sulphureo pleno.

B. 2 +

a.

5. - fl. pleniss. petalis partim flavis par-
tim viridibus B. 19.Et Plusieurs autres especes se trouvant dans
le Catalogue des oignons.

A 12 +

c.

1. Nereum fl. rubro B. 1.

A. 12 +

c.

2. - fl. albo B. 2.

A. 12 +

d.

3. - fl. Carnæo odorato B. 3.

A. 12 +

d.

4. - fl. variegato odorato pleno B. 4. & 5.

A. 12 +

d.

5. - eadem fol. Elegantiss. variegato.

F. 12 +

f o x.

6. An, nereum fol. oblongis fl. pulchro pur-
pureo ex america Calidiore.

F. 12 +

c.

Nicotiana fruticosa perennis fol. angustioribus.

F.	e. o.	Ocimum Zeylanicum perenne frutescens R. 3.
P. II +	a.	Oenanthe flosculis radiantibus umbellarum proliferis R. 4. B. 5.
A. S	c.	1. Olea sativa B. 1.
A.	c.	2. - - fol. duro subtus incanis B. 2. R. 1.
A.	c.	3. - - fol. buxi crasso atroviridis lucido B. 3. R. 2.
A. S	c.	4. - - fol. longo lato B. 4.
A.	c.	5. - - fol. longo angusto B. 5.
P. V +	a.	Omphaloïdes pumila verna fl. cœruleo B. 1. <i>Cynoglossum</i> R. 4.
P. Ω	a.	1. Ononis spinosa fl. purpureo R. 1. <i>anonis</i> B. 1.
P. Ω	a.	2. - - spinis carens candidis floribus, <i>ano-</i> <i>nis</i> B. 3.
F. Ω	d.	3. - - frutescens fl. rubro amplo R. 7. <i>ano-</i> <i>nis</i> B. 8.
R. 8	a.	Ophioglossum fol. ovato spica disticha R.
R. 8	a.	Ophris, bifolia R. 1.
A. II	a.	1. Opulus fructiferens fl. simplici B & R. 1.
A. II +	a.	2. - - flore globoso B. 2.
A. II +	a.	3. - - fl. globoso fol. Eleg. varieg.
F.	e. f.	1. Opuntia curasavica minica B. <i>Cactus</i> R. 13.
F.	e. f.	2. - - flagelliformis angustiss. & longiss. fol- lio spinosissimo B. 9.
F. ⅞ +	d. f.	3. - - maxima fol. spinoso latiss. & longiss. B. 1. <i>Cactus</i> R. 15.
F. ⅞ +	d.	4. - - fol. latiss. spinis flavis fl. aureo om- nium maximum.
F.	e.	5. - - fol. spinoso longiss. & angustissimo B. 4.
F.	c.	6. - - latifoliis spinis albis numerosis or- nato B. 10.
P. ⅞ +	c.	7. - - fol. minori rotundiori & compres- siori B. 3.
P.	e.	8. - - parva omnium minima.
B. II +	b.	1. Orchis radice subrotundis, muscum re- ferens.
		2. Or.

Habitus

Culture

B. II	b.	2. Orchis radice palmatis fl. ex albo viridis.
B. II	b.	3. - - radice palmatis angustifolia fl. purpur.
B. II†	a.	4. - - radice palmatis fol. maculato, fl. variegato.
B. II†	a.	5. - - testiculatis fl. purpureo.
B.	c.	1. Ornithogalum fol. cordato ovatis R. 1. B. 9.
B. II	b.	2. - - latifolium maximum B. 3.
B. II	b.	3. - - exoticum magno fl. minori innato B. 11.
B. II	b.	4. - - angustifolium fl. ex albo virescentibus B. 4
B. II	b.	5. - - spicatum fl. viridi lactescente B. 5.
P. 5†	a.	1. Orobancha caule ramoso fl. purpurascens B. 2. R. 1.
P. V†	a.	2. - - purpureis sylvaticus vernus B. 1. R. 3.
P. V	a.	3. - - vernus fl. albicante B. 8.
P. 5†	a.	4. - - latifolia repens fl. purpureo multiflora B. 6.
P. 5	a.	1. Osmunda sive filix florida R. 3. B. 1.
P. 5	b.	2. - - frondibus duabus decompositis R. 2.
P. 5	a.	3. - - frondibus pinnatis R. 4. polypodium Virginianum sensibile B. 3.
F. 5	d.	1. Oenothera afr. odorat. spinosum & viscosum R. 1. Chrysanthemoides B. 1.
F. 5	d.	2. - - fol. retuso dentato fl. aureo baccifera.
F. 5†	c.	3. - - fol. populi albæ R. 2. Chrysanthemoides B. 2.
F. 5	c.	4. - - fol. lanceolato dentato fructu tricocco & tetracocco.
B. 8	c.*	1. Oxys bulbosa ethiopica fl. ex albo purpurascens B. 5. oxalis R. 3.
B. 8†	c.*	2. - - bulbosa afric. fl. purpureo amplo B. 6. oxalis R. 2.
B. 8	c.*	3. - - bulbosa afr. fl. luteo.
A. II†	a.	1. Padus glandula duabus basi foliorum subjectus R. 1. Cerasus R. 5.
		2. Pa-

Habitus

Culture

A.

a.

2. *Padus Virginianus* fol. deciduis lanceolatis ovatis; ferratis.

R. II

a.

1. *Pœonia* fl. pleno rubro major B. 9.

R. II +

c.

2. - - fl. pleno albo major B. 11.

R. II +

a.

3. - - fl. pleno roseo major.

R. II +

a.

4. - - fl. pleno purpureo tenui fol. B. 12.

R. II

a.

5. - - fl. purpureo, *Coral pœoni* vulgo.

P.

f.

1. *Palma Japonica* polypodi fol. B. 8. *Cycas* R.

P. III

d.

2. - - humilis fol. flabelliformi pedunculo spinoso B. 3. *chamærops* R. 1.

P.

f.

3. - - *Zeylanica* non spinosa, *chamærops* R. 2.

P.

d.

4. - - *dactylifera* mas. } *Phoenix* R. da.

P.

d.

5. - - *dactylifera* foemina. } *delboom*.

B. 5 +

b.

1. *Pancratium* spatha multiflora fol. ensiformibus flore albo odorato R. 2. *narcissus* *illyricus* B. 24.

B. 5 +

f. o. x. f.

2. - - - *amer.* fol. latiss. floribus niveis majoribus, odore balsami peruvianis

B. 5 +

f. o. x. f.

3. - - - *Zeylanicum* fl. albo odorato M. 7.

P. 8

a.

1. *Papaver erraticum* flavo flore, B. 30. R. 4.

P. 5 +

a.

2. - - orient. hirsutiss. fl. magno auranteo B. 17. R. 5.

P. 5 +

a.

3. - - eadem fl. maculato.

F. 100

f. o. x.

Parkinsonia aculeata R.

P. II +

a.

Parnassia B. & R.

F.

d.

1. *Parthenium peruvianum* arboreum R. 1. *iva* L. 2. *ageratum* B. 7.

P. 5 +

a.

2. - - - fol. ovatis crenatis fl. albo R. 2. *tarchonanthos virginiana*.

F. 5

d.

Passarine fol. linearibus R. 1.

F. III

b.

1. *Paulinia* fol. pinnatis R. 1. *Cururi* Plumier.

F.

b.

2. - - - fol. simplicibus lanceolatis ferratis L. Hortus upsal.

A. 5

a.

Pavia R. & B. *arbor pentaphyllos virginiana*.

F. 8 +

f. o. x.

Pentapetes fol. hastato L. 1. *blättaria* *Zeylanica* flore amplo coccineo.

Pen-

Habitus	Culture	
F. ♂ †	a.	Pentaphylloides fruticosum B. 4. <i>Potentilla</i> R. 1.
F.	e. o. f.	Pereskia aculeata fl. albo R.
✓. ♀ †	a.	Periploca monspeliaca fol. acutioribus B. 3. <i>Cynanchum</i> R. 2.
P. ♂	a.	1. Pervinca fol. ex auro variegato B. 7.
P. ♂	a.	2. - - fol. ex argenteis variegato.
P. ♂	a.	3. - - flore pleno saturate purpureo B. 6.
P. Ω	a.	Peucedanum foliolis linearibus ramosis R. 3.
F.	b.	Phaseoloïdes Caroliniensis fruticosa, <i>glycine</i> R. 2.
F. ♂ †	a.	Philadelphus R. <i>syringa alba</i> B. 1.
A. ♂	b.	1. Philyrea crasso latiss. atroviridis fol. quasi ilicis B. 1.
F. ♂	c.	2. - - fol. ovato lanceolatis vix crenatis R. 1. B. 7.
F. ♂	c.	3. - - fol. lanceolatis integerrimis B. 3. R. 8.
F. ♂	b.	1. Phlomis fruticosa fol. salvia latiori B. 2. R. 1.
F. ♂ †	b.	2. - - fruticosa fol. salvia longiori B. 3.
A. ♂ †	c.	3. - - frut. fol. salvia subrotundo brevior B. 4.
F. ♂	b.	4. - - fl. purpurascens B. & R. 1.
P. ♂	b.	5. - - multifido folio, <i>Leonurus</i> L. 1.
P. Ω †	b.	1. Phlox fol. lineari lanceolatis R. 1. M. 1. fl. pulchro purpureo.
P. ♀ †	a.	2. - - fol. ovato lanceolato caule reclinato M. 3. fl. rubello.
P. ♀ †	a.	3. - - fol. lanceolatis linearibus caule ela- tior M. 4. fl. purpureo.
P. Ω †	a.	4. - - fol. lucidis acutis floribus quasi um- bellatis M. 2. flore rubro.
R. Ω →	a.	1. Phytolacea amer. majori fructu R. & R. 1.
F. ♂ †	e. o.	2. - - - amer. fructu minori B. 2. <i>divinia</i> R.
F. ♂ †	e.	3. - - - mexic. baccis sessilibus M. 2. L. 1. caule viridi fl. albo.
F. ♂ †	e.	4. - - - baccis sessilibus, caule, flore, & folio rubello.

	d.	1. Pimpinella spinosa sempervirens B. 7. <i>Poterium</i> R. 3.
P. ♀ + †	a.	2. - - - maxima canadensis B. 1. <i>sanguisorba</i> R. 2.
A.	a.	1. Pinus sativus B. 1 R. 2.
A.	a.	2. - - - silvestris B. 2. R. 1.
A.	c.	3. - - - hierosolymytana prælongis & tenuissimis viridibus setis M. 15.
A.	c.	4. - - - am. longiss. & viridibus setis M. 19.
A.	b.	5. - - - virgin. minori cono M. 18.
R. ♂ + †	f. o. x.	Piper fol. cordatis caule procumbente R.
A.	e.	Pittonia racemosa, <i>Tournefortia</i> R.
P. ♂ + †	a.	Plantago tartarica floribus roseis.
F.	e.	Plumbago Ceylanensium fl. lacteo B. & R. 1.
F.	g. o. x. f.	Plumieria fol. angustis fl. luteo ex senegal.
F.	g. o. x.	1. Poinciana fol. duplicato pinnatis R. 1. flore luteo.
F.	g. o. x.	2. - - - eadem fl. ex rubro & luteo Eleg. variegato
P. ♀ + †	a.	Polemonium fl. cœruleo fol. variegato.
B. m + †	c. *	1. Polianthos fl. umbellato cœruleo, R. 1. <i>Crinum</i> L. 4. <i>Ilyacintbus afr</i> fl. umbellato.
B. ♂ + †	e. x. ff.	} <i>Tuberosen vulgo</i> 2. - - - floribus alternis R. 1. <i>Hiacintbus indicus tuberosus</i> B. 1, flore simplice 3. - - - florib. alternis fol. limb. aureis. 4. - - - florib. alternis fl. pulcherrimo pleno, <i>Hiacintbus tuberosus fl. pleno</i> B. 2.
B. ♂ + †	e. x. ff.	
B. ♂ + †	e. x. ff.	
P. ♂ + †	a.	1. Polium pyrenaicum hederæ terrestri folio B. 5. <i>teucrium</i> R. 4.
P. ♂	b.	2. - - - montanum album supinum fol. ad suprema crenato capitulis multis globosis B. 8.
P. ♂	b.	3. - - - montanum luteum ferratis angustioribus incanis fol. B. 7.
P.	e. o.	1. Polypodium amer. magis dissectis caule & costa villosis L. 54.
P.	a.	2. - - - fronde duplicato pinnato R. 5.
		3. Po-

Habitus	Culture	
P.	c.	3. Polypodium fronde alternatim duplicato pinnato R. 7.
P. Ω	c.	4. - - fronde duplicato dorso bulbiferi R. 9.
P.	c.	5. - - fronde alternatim supra decomposito R. 10.
P.	c.	6. - - fronde pinnato foliolis lanceolatis R. 1.
A.	a.	1. Populus (similio) arbor resinosa B. 5. R. & L. 4. gemmis balsamum odoratissimum fundentibus <i>tacamanaca theophrasti</i> .
A.	a.	2. - - alba fol. variegato M 5.
A.	a.	3. - - Caroliniensis fol. ampliff. cordiformibus caule caniculate.
F.	c. o f.	1. Portulaca afr. sempervirens fl. rubicundo B. 5. <i>anacampseros</i> R. 1
P. m	d. f.	2. - - fol. ovatis petiolatis flore muscoso capsula bifurca R. 2.
P. Ω +	a.	1. Potentilla rectum luteum R. 6. <i>quinquifolium</i> B. 1.
P. Ω +	a.	2. - - rectum floribus subluteis, <i>quinquifolium</i> R. 4.
P. δ	a.	3. - - album majus alterum R. 8. <i>quinquifolium</i> B. 9.
F. δ	c.	<i>Prasium</i> fol. ovatis fl. magno candido tantilla purpurea varie notato, R. 2. <i>galeopsus</i> B. 9.
P. ♂ +	a.	1. <i>Primula veris</i> fl. pleno pallido luteo B. 12. ordo 1.
P. ♂ +	a.	2. - - veris fl. pleno roseo.
P. ♂ +	a.	3. - - veris fl. pleno Coccineo.
P. ♂	a.	4. - - veris fl. luteo duplici umbellato B. 1. ordo 2. <i>herba paralysis vulgo</i> .
P. ♂	a.	<i>Primula veris</i> fl. umbellato flores foliisque.
P. ♂ +	b.	Et d'ailleurs un assortiment de plus que 100. especes extremement beau, peinte en toute sortes des Couleurs, d'ont on trouve les noms Couleurs & prix dans une Catalogue separate.
A.	a.	<i>Prunus Virginiana</i> . II 2

No

Habitus

Catalogue des Plantes Etrangères.

Culture

A.	a.	Pseudoacacia vulgaris B. 1. Robinia R.
A.	a.	Ptelea virgin fol ternatis L. 1.
A. γ	a.	Pulmonaria alpina maculosa B. 2.
A. μ†	c.	1. Punica vel granatum fl. simplici B. 1.
A. μ†	c.	2. - - vel granatum fl. pleno maiore B. 2.
F. μ†	d.	3. - - vel granatum americanum- pumila M 5. 1. 2.
A.	c.	4. - - vel granatum americ. fructu maximo.
A.	a.	7. Quercus fol. Eleganter variegatis M. 3.
A.	a.	2. - - pumila virgin. Castaneæ fol. M. 27.
A.	a.	3. - - fol. amplioribus aculeatis M. 33.
A.	a.	4. - - calice echinato glande maiore M. 5.
A.	a.	5. - - calice echinato glande minore.
A. μ	c. o.	Randia fruticosa fol. subrotundo fl. albo L. 1.
R. μ†	a.	1. Ranunculus fol. plantaginis B. 66. R. 4.
P. δ†	a.	2. - - - hortensis erectus fl. luteo pleno B. 4.
R. μ†	a.	3. - - - fol aconiti fl. albo pleno B. 12.
P. μ†	a.	4. - - - bulbosus fl. pleno luteo B. 14.
R. γ†	a.	5. - - - rutacei fol. fl. pleno luteo B. 29.
P. μ	a.	6. - - - montanis latiss. fol. hirsuto.
P. μ	a.	7. - - - seminibus aculeatis R. 13.
R. μ†	a.	8. - - - pumila fol. integerrimis lanceolatis fl. aureo amplo
R. γ†	a.	9. - - - vel Cheledonium minus, fl. pleno
B.	b.	Renunculus d'ont on trouve une Collection d'environ mille especes d'une beaute achevée en toute sortes des Couleurs, trouvant on annuellement le noms Couleurs & prix dans le Catalogue des oignons.
P. δ	a.	Reseda foliis omnibus trifidis B. & R. 3.
P. ε	a.	Rhabarbarum, T. Rheum R. Lapatium præstantissimum B. 1. foliis lobatis.
A. ε	a.	1. Rhamnus Catharticus B. 1 R. 7.
A.	b.	2. - - floribus trigynis aculeis geminatis R. 1. paliurus B.
A. Ω	c.	3. - - - afer fol pruni flore candicante spinis foliosis B. Celastris R. 2.
		4. Rham-

Habitus	Culture	
F. m	e. o.	4. Rhamnus spinis ex alis foliorum seu jujuba americana-spinosa R. 4.
A. S	a.	1. Rhus fol. pinnatis ferratis B. & R. 1.
A.	a.	2. - - fol pinnatis fructu rhomboïdea B. 3. R. 2.
A. S	a.	3. - - fol. ternatis R. 4. toxicodendron B. 1.
F.	a.	4. - - amer. caule volubili fol. ternatis.
A.	a.	5. - - amer. fol pinnatis ferratis glabris L. 3.
A.	c.	6. - - af. trifoliata minus glabrum splendente folio B. 11. R. 7.
A. m	c.	7. - - af. trifoliata majus glabrum subrotundo medio quandoque crenato B. 12.
A. m	c.	8. - - af. trifol. angusto glabro.
A. m	c.	9. - - af. trifol glabrum angustissimum.
A. m	c.	10. - - af. trifol. glabrum oblongo obtuso.
A. S +	a.	11. - - canadensis panicula Eleganter coccinea.
F. II	a.	1. Ribes alpinum dulce B. 5. R. 3.
F. II	a.	2. - - fructu rubro fol. Eleg. variegato.
F. II	a.	3. - - fructu nigro fol Eleg variegato.
F. II	a.	4. - - ex Virgin. ribici nigro similis, inodore
F. S	e.	Ricinus amer perennis B. 4.
F. S +	a.	1. Rosa Carnæo fl. pleno parvo B. 17.
F. S +	a.	2. - - humillima fl pleno parvo suaverubente.
F. S +	a.	3. - - pedunculo muscoso B. 12.
F. S +	d.	4. - - spinosiss. pimpinella fol glabra fl pleno livide rubente.
F. S +	a.	5. - - rubra pallidiore fl. pleno T.
F. S +	a.	6. - - spinosiss fl. pleno pallido.
F. S +	a.	7. - - flore carnæo pleno.
F. S	a.	8. - - amplissima fl. pleno.
F. S +	a.	9. - - spinis carens fl. pleno rubello T.
F. S +	a.	10. - - fl. pulchro purpureo pleno per intervalla flos ex flore.
F. S +	a.	11. - - lutea multiplex B. 4.
F. S +	a.	12. - - ex rubro nigricante fl pleno T.
F. II	a.	13. - - odore cinnamomi fl pleno T.
F. S +	a.	14. - - fl. pleno suave rubente.

Habitus

Culture

F. 5+	a.	15. Rosa fl. pleno ex purpureo rubello.
F. 5+	a.	16. - - fl. pleno amplo purpureo.
F. 5+	a.	17. - - fl. pleno albicante.
F. 5+	a.	18. - - fl. pleno purpureo T.
F. 5+	a.	19. - - fl. pleno ex rubro purpureo.
F. 5+	a.	20. - - fl. pleno pallido.
F. 5+	a.	21. - - fl. pleno purpurascens.
F. 5+	a.	22. - - omnium Calendarium fl. pleno car-
		neo T.
F. 5	a.	23. - - lutea simplex B. 1.
F. 5+	a.	24. - - fl. pleno quasi umbellato.
F. 5+	a.	25. - - prænestina fl. variegato pleno B. 24.
F. 5+	a.	26. - - regina dicta ; per intervallos flos ex
		flore.
	a.	27. - - anglica fl. pleno variegato T.
F. 5+	b.	28. - - muschata fl. albo pleno B. 16.
F. 5+	a.	29. - - fl. pleno Carneio in medio rubente B. 8.
F. 5	a.	30. - - pomifera major T.
F. 5+	a.	31. - - fl. pleno ex rubro nigricante T.
F. 5+	a.	32. - - rubello pleno B. 12.
F. 5+	a.	33. - - Eglanteria spinosiss. fol. odorat. fl. albo
F. 5	a.	34. - - saturatius rubens T. flore pleno.
F. 5	a.	35. - - multiplex media T. flore pleno.
F. 5+	a.	36. - - fl. pleno amplo ruberrimo B. 29.
F. 5	b.	37. - - Eglanteria fol. pimpinella glabra fl.
		rubro parvo pleno.
F. 5	b.	38. - - sempervirens
F. 5+	a.	39. - - fl. pleno saturateis purpureis
	a.	40. - - fl. pleno saturateis rubens.
A. 5+	a.	41. - - fl. albo pleno B. 10.
F. 5	a.	42. - - sine spinis fructu globoso.
F. 5+	a.	43. - - virg. humillima fl. ex purp. & rubro
		maculis.
F. II	b.	1. Rosmarinus fol. ex albo Eleg. varieg. B. 4.
F. II	b.	2. - - fol. aureis striatis B. 2.
A. V	c.	1. Rojena R. 1. Staphylodendron af. fol. singu-
		lari lucide B. 3.
		2. Ro.

Habitus

Culture

F. γ	d.	2. Rojena fol. lanceolatis glabris R. 2. <i>Vitis</i> <i>idea fol. myrti angustissimo</i> B. 4.
P. π†	a.	Rubia fol. quaternis glabris R. 1. B. 4.
F. δ†	a.	1. Rubus odoratus B. 5. R. 4.
γ. Ω†	a.	2. - - fl. albo pleno B. 6.
γ. Ω	a.	3. - - major fol. varieg M. 4.
P. δ†	b.	1. Rudbeckia integri folia radio aureo umbo- ne atro rubente L. 3. M. 1.
P. δ	b.	b. - - - petalis radii bifidis L. 4. M. 2.
P. Ω m	a.	3. - - - fol. compositis lacineatis R. 1.
R. δ†	c.	Ruellia amer. asphoduli radice M. 1.
P. π	b.	1. Ruscus myrti fol. aculeato B. R. 1.
P. π	b.	2. - - latifol. fr. fol. insidente B. & R. 2.
P. π	b.	3. - - angusti folio fructu fol. innascente B. & R. 3.
F. π	b.	4. - - angusti folio racemosa B. & R. 4.
F. δ†	b.	1. Ruta chalapensis latifolius florum petalis villis scatentibus B. 5. M. 4.
F. δ	c.	2. - - chalapensis tenui fol. florum petalis villis scatentibus B. 4. M. 5.
F. δ	c.	Rapunculus Valerianoïdes cœruleis umbella- tis B. <i>trachelium</i> R.
F.	d.	Salicornia arabica articulis obtusis L. 2.
A. γ	a.	1. Salix montana major foliis Laurinis B. 11. R. 2.
A. γ	a.	2. - - fol. Elegantiss. variegato M. 9.
A. γ	a.	3. - - babylonica ramis pendulis R. 10.
A. γ	a.	4. - - fol. buxi majore.
F. δ	c.	1. Salvia fol. hastata triangularibus R. 3. <i>scalaria</i> B. 12.
P. δ	a.	2. - - fol. cordatis fl. luteo variegatis R. 4. <i>scalaria</i> B. 15.
F. +	c.	3. - - mexicana altiss. facie heliotropi R. 5.
F. Ω	d.	4. - - af. fol. schorodonea fl. violaceo R. 6. B. 14.
F. Ω†	d.	5. - - af. fol. schorodonea fl. amplo in fa- stigium convoluta.
F. δ	c.	6. - - af. frutesc. fl. magno aureo R. 7. B. 15. 7. Sal-

Habitus

Culture

P. 5

b.

7. Salvia fol. dentato pinnato asperis R. 8.
sclarea B. 13.

F. 8 +

d.

8. - fol. cordato sagittatis dentatis R. 10.
Lamium B. 13.

F. 5

b.

9. - major hispanica fl albo B. 2.

F. 5

b.

10. - tricolor variegato B. 3.

F. 5

b.

11. - fol luteis variegatis B. 4.

F. 5

b.

12. - fol. magis undulatis B. 17.

P. 5

a.

13. - fol. ferratis Sinuatis R. 17.

A. 8

a.

1. Sambucus racemosa rubra B. 3. R. 2.

A. 8 +

a.

2. - fol. Eleganter variegato B. 6.

A. 8 +

a.

3. - apii folio B. 7.

A. 8

a.

4. - fructu ex viridi albo B. 2.

F. 5 +

c.

1. Santolina fl. majore foliis villosis incanis.
B. 2.

F. 5

b.

2. - fol. teretibus B. 1. R. 2.

F. 8 +

b.

3. - fol obscure virentibus fl. aureo B. 3.

F. 8 +

b.

4. - eadem fl. sulphureo.

F. 8 +

b.

5. - fol. minus incanis fl. aureo B. 4.

F. 8 +

b.

6. - eadem fl. sulphureo.

F. 5

b.

7. - hispanica fol. vermiculatis B. 11.

F. 8

c.

8. - tomentosa fol oblongis R. 6. gna-
phalium B. 1.

F. 8

d.

9. - agerati fol. B. 8. Chrysanthemum
R. 7.

P. 5

a.

1. Saponaria fl. pleno R. 1. Lychnis B. 26.

F. 8

c.

2. - orient. fol. lanceolatis R. 3. Lychnis
B. 38.

P. 5 +

a.

1. Satureja fl. in pediculis ramosis B. & R. 2.

P. 5

a.

2. - cretica fol. rigido brevi crasso B. 3.
R. 4.

R. 12 +

c. o. x.

Saururus fol. profunde cordatis R. 2.

B. 11 +

a.

1. Saxifraga fl. albo pleno B. 2.

P. 11

a.

2. - procumbens fol. linearibus inte-
gris & trifidis R. 6 B. 10.

P. 11

a.

3. - procumbens fol trifidis & quin-
quifidis R. 7.

P. 5 +

a.

4. - sedi fol. multiflora B. 7.

5. Saxi-

Habitus

Culture

P. ☉

a.

5. Saxifraga fedi fol. angustiori serrato B. 8.
R. 1.

P. ☉ +

a.

6. - - - fol. subrotundis serratis B. 9.

P. ☉

a.

7. - - - pistillo flore, pallido, geum B. 4.

P. ☉ +

a.

8. - - - pistillo flore, rubro, geum B. 5.

F. ♂ +

c.

1. Scabiosa af. frutescens fl. roseo B. 1.
R. 7.

F. ♂ +

c.

2. - - - af. frutes. fol. lanceolatis integris
R. 8. B. 16.

F. ♂ +

c.

3. - - - afr. frutes. fol. rigido serrato splen-
dente fl. albo.

F. ♂ +

b.

4. - - - afr. frutes. fol. linearibus fl. roseo
Corollis quinquifidis.

P. ♀ +

a.

5. - - - fl. globoso niveo B. 4. R. 3.

P. ♀ +

a.

6. - - - fl. globoso rubro.

P. ♀

a.

7. - - - maxima fl. albo globoso.

B.

c. *

Scilla radice rubra R. 1. B. 1.

P. ♀ +

b.

1. Sclarea indica fl. variegato B. 10. *flos*
pestigridis vulgo.

P. ♀ + +

a.

2. - - - orient. betonice acutiss. fol. spica
purpurascence M. 9.

P. ♀ +

a.

3. - - - tartarica betonice fol. acutiss. loba-
tis spica longiss. purpureis.

P. ☉ +

b.

1. Scrophularia hispanica sambuci fol. gla-
bra B. 7. R. 4. flore rubro luteo vario
pulchro.

P. ☉ +

c.

2. - - - fol. pinnatis ruta canina dicta
B. 9. R. 5.

P. ☉

c.

3. - - - laserpitii massiliensis folio.

P. ☉ +

c.

1. Scutellaria fol. pinnatis flore luteo R. 1.
Cassida B. 9.

P. ☉ +

a.

2. - - - alpina supina fl. magno cœruleo
R. 3. *Cassida* B. 12.

P. ♂

b.

3. - - - fol. cordato fl. albo R. 5. *Cassi-*
da B. 11.

P. ☉ +

a.

4. - - - fol. cordato oblongo fl. purpu-
reo R. 6. *Cassida* B. 7.

P. ☉

a.

5. - - - fol. lanceolatis dentatis flore
albo.

I

1. Sc-

Habitus

Culture

F. m^{t}

d. f.

1. Sedum majus arborescens B. 1. Sempervivum R. 1.

F.

d. f.

2. - majus arborescens fol. ex albo variegato B. 2.

F.

d. f.

3. - majus arborescens fol. ex pallide luteo & viridi varieg.

P. m^{t}

d. f.

4. - canarinum omnium maximum B. 3.

P. m^{t}

a.

Sempervivum R. 2.

5. - montanum tomentosum B. 10. Sempervivum R. 5.

P.

a.

6. - Crispum & monstrosus B. 14.

P. m^{t}

a.

7. - alpinum minus fl. Eleganter rubro B. 11.

R. m^{t}

a.

8. - globulis decidentibus B. 9. Sempervivum R. 4.

P. m^{t}

a.

9. - minimum luteum non acre B. 20.

F. m^{t}

c.

Senecio afr. fol. retuso B. 5. Jolidago R. 6.

P. m^{t}

a.

1. Serratula fl. purpureo B. & R. 1.

P. m^{t}

a.

2. - fl. candido B. 2.

A. m^{t}

a.

Siliquastrum fol. cordato orbiculato, B. 1. Cercis R. 1. arbor juda vulgo.

P. m^{t}

a.

Seseli ferulae facie tenui folio B. 3.

P. m^{t}

a.

Silphium fol. ternatis R. 2.

B. m^{t}

d. *

1. Syzyrinchium afr. parvum palmatis folio.

B. m^{t}

d. *

2. - afr. palmatis fol. fl. pulchro purpureo.

B. m^{t}

d. *

3. - afr. palmatis folio fl. ex roseo & rubro misto.

B. m^{t}

d. *

4. - afr. iridis fol. fl. pulchro purpureo.

F.

b.

1. Smilax asper fol. cordato oblongo. R. 2.

F.

b.

2. - asper fol. cord. oblongo acuto. R. 2.

P. m^{t}

a.

Smiridium fol. caulinis ternatis petiolatis R. 2.

F.

e. o.

1. Solanum amer. frutes. spiniferum spinis igneis M. 9.

F. m^{t}

d.

2. - pomiferum fol. profunde lacineatis B. 10. R. 8.

F. m^{t}

d.

3. - pomiferum fol. tomentoso incano caule solo spinoso B. & R. 12.

4. So.

Habitus

Cultüre.

F. Ω †

c.

4. Solanum lignosum fl. cœruleo amplo lauri folio B. 16. R. 7.

F.

e.

5. - - - afr. scandens hœderæ folio.

F. ♂ †

a.

6. - - - scandens fol. ex albo variegato B. 3.

F. ♂ †

b.

7. - - - scandens latifolio ex aureo Eleganter variegato.

F.

c.

8. - - - lignosum fol. laurinis caule atro viridi R. 7.

F. Ω →

c.

9. - - - frutescens fol. retuso fructu ceratino B. 14. R. 6.

P. √ †

c.

Soldonella alpina B. & R. 1.

F. II

b.

Sorbus virgin arbuti folio, *mespilus* R. 3. *Crataegus* B. 3.

F. Ω

c.

Spartium fl. luteo B. 1. R. 2.

A. ∞ †

a.

1. Spirea opuli folio B. & R. 2.

F. II †

a.

2. - - hyperici folio B. & R. 3.

F. ♂ †

a.

3. - - salicis fol. flore roseo B. & R. 1.

F. ♂ †

a.

4. - - amer. fol. oblongis crenatis fl. albo M. 5.

A. ∞

a.

1. Staphylodendron B. 1. *staphylæa* R. 1.

A. ∞

a.

2. - - - virginianum B. 2. *staphylæa* R. 2.

P. √

a.

Statice fol. angustioribus fl. albo B. 3.

A.

c.

Styrax fol. mali cotonei B. & R.

A.

b.

Suber latifolium perpetuo virens B. 1. *quercus* R. 5.

P. ♂

a.

Symphitum fl. purp. fol. variegatis.

F. ♂

d.

Struthia L.

A.

g. o. x.

Tamarindus B. & R.

F. √ †

b.

Tamariscus narbonensis B. 2. R. 1.

F. R √

c.

Tamus fol. cordato B. & R.

F. ♂

d.

1. Tanacetum afr. arborescens major B. 4. R. 2.

F. ♂

d.

2. - - - afr. frutescens minor B. 6. R. 4.

A. √

c.

1. Tarchonantus R. *Elychrisum arbor afr. salvia* fol. odorato fl. purpureo violaceo B. 11.

A. √

c.

2. - - - eadem foliis latioribus undulatis.

I 2

1. Te-

Habitus

Culture

F. ♂	d.	1. Tetragonocarpus afr. fol. longo & angusto, B. 1. <i>tetragonia</i> R. 1.
F. ♂	d.	2. - - - afr. fol. longo lato B. 2.
P. Ω	c.	3. - - - afr. fol. portulacæ radice crassa B. 3. <i>tetragonia</i> R. 2.
F. ♂†	c.	1. Teucrium bæticum fl. violaceo B. 3. R. 1.
F. ♂†	c.	2. - - - bæticum fl. violaceo fol. variegatis B. 4.
F. Ω	b.	3. - - - fl. pallido luteo B. 4. R. 15.
F. Ω†	b.	4. - - - calyce tubulato fl. purpureo B. 2.
P. Ω	b.	5. - - - fol. ovatis utrimque acutis R. 16. <i>Chamadrys</i> B. 16.
P. Ω	a.	1. Thalictrum minimum montanum atrorubens B. 13. R. 5.
B. π†	a.	2. - - - minus fl. albis majoribus B. 15. R. 7.
P. Ω	a.	3. - - - minimum foetidissimum B. 12.
P. Ω	a.	4. - - - aquilegiæ fol. staminibus albis B. 1.
P. Ω	a.	5. - - - aquil. fol. stam. purpureis B. 4.
P. Ω	a.	6. - - - prætensis angustifolio B. 9.
P. Ω	a.	7. - - - prætensis angustissimo fol. B. 3 R. 10.
P. Ω†	a.	8. - - - majus staminibus luteo, glauco folio B. 8.
A.	f. o.	Theobroma fol. serratis R. Cacao T.
A. γ	a.	1. Thuya vulgaris theophrasti R. 1.
A. γ	a.	2. - - - fructu cœruleo subrotundo squamoso R. 2. <i>thuya chinensis</i> .
P. π	a.	1. Thymus odorata fl. albo.
P. π	a.	2. - - - vel serpillum fol. varieg. M. 3.
P. π	a.	3. - - - vel serpillum afr. hirsutissimum.
A. ♂†	b.	1. Tinus } secundus Clusii B. 2. fol. glabri amplo flore.
A. ♂†	b.	2. - - - } eadem fol. variegatis.
A. ♂†	b.	3. - - - } primus Clusii B. 1 fol. subbir- sutiis fl. extus roseis.
A. ♂†	b.	4. - - - } tertius Clusii B. 8. fol. minoribus.
A.	a.	5. - - - } Virginianus fol. ovato oblongo serrato M. 7.

1. Ti-

Habitus

Culture

F. ☉ †

b.

1. Tithymalus characias amygdaloïdes fol.
Eleganter varieg. B. 3.

F. ☉

f. o. x. f.

2. - - - amer. cotini fol. B. 27, *Euphorbia* R. 11.

F. ☉ †

a.

3. - - - sylvaticus lunato flore B. 37.
Euphorbia R. 22

F.

f. o. x. f.

4. - - - Curassavicus myrti ampliore fol.
M. 1. *Euphorbia* R. 1. *tithymaloïdes* B. 1.

F.

f. o. x. f.

5. - - - curassavicus lauri cerasi fol. M. 2.

F. ☉

e f.

6. - - - af. fruticosus fol. lanceolatis cau-
le coralli colore B. 14.

F. ☉

d. f.

7. - - - indicus frutescens pentaphyllos
B. 28.

F. ☉ †

d f.

8. - - - orientalis salicis fol. fl magno
B. 31. *Euphorbia* R. 28.

F. γ †

b.

9. - - - arboreus fol. glauco angusto
B. 6.

F. II

b.

10. - - - fol. lini rotundiori B. 38.

F. II

d f.

11. - - - fol. lini acutiori.

F. δ

d. f.

12. - - - fruticosus fol. parvis capsula
villosis.

F. II

b.

Tragacantha fol. non deciduis fl. albo B. &
R. 1.

F. δ †

d.

1. Trifolium afr. fruticans fl. purpurascence
B. 23. R. 5.

F. δ †

d.

2. - - - eadem fl. pallescence.

P. ☉ †

a.

3. - - - montanum spica longissima rubente
B. 3 R. 18.

B. γ

a.

1. Tulipa præcox lutea T.

B. γ

a.

2. - - - præcox fl. coccineo puniceove ruti-
lante T.

B. γ

a.

Tulipes printanieres dont on trouve un assor-
timent de plus que 100. especes.

B. II

a.

Tulipes a fleurs doubles un assortiment de
Cinquante especes differentes.

B. II

a.

Et d'ailleurs un assortiment presque innombra-
ble de toutes sortes des Tulipes, Comme.
des bisarrées en rouge, brun, violette, des
baguettes primo; Rigaux & une multitude
des autres especes d'une beauté achevée,
d'ont

d'ont on trouve annuellement les noms
Couleurs & Prix, dans le Catalogue des
oignons.

F. ♂	fo.	Turnera petiolis floriferis fol. ferratis R.
P. ♂	b.	Tussulago alpina rotundi fol. glabro B. & R. 2.
F. ♂ †	a.	1. Ulex fl. luteo, R. 1. Genista spartium spinosa B. 1.
F. II	e.	2. - - flore rubro R. 2. L. 2. <i>Kaapse Hase- gaay-boom</i> vulgo.
F. =	f.	Urena fol. angulatis R. L. 1.
P.	c.	1. Urtica Chinensis fol. subtus argenteis R. 5. L. 12.
P. III	a.	2. - - virgin. urens, fol. duplicato pinna- to, L. 5.
P. ♂ †	a.	1. Valeriana fol. infimis integris, proximis lacineatis R. 1.
P. II	a.	2. - - - fol. omnibus pinnatis R. 2.
P. ♂ †	a.	3. - - - fol. lanceolatis integerrimis R. 5. B. 9. fl. rubro.
P. ♂ †	a.	4. - - - eadem fl. albo B. 10.
P. ♂ †	c.	Verbena amer altiss. fl. cœruleo B. & R. 2.
P. Ω	a.	1. Veronica virg. altiss. spica multiplici fl. candidis B. 24. R. 1.
P. Ω †	a.	2. - - - virg. altiss. spica multiplici fl. can- didis, foliis eleganter dentatis.
P. ♂ †	a.	3. - - - austriaca fol. magis dissectis fl. pul- chro cœruleo.
P. ♂ †	a.	4. - - - fol. oppositis dentatis fl. cœruleo.
F. ♂ †	c.	1. Viburnum amer. urticæ fol. non spinosa flore albo <i>lantana</i> R. 1.
F. ♂ †	c.	2. - - - amer. urticæ fol. spinoso fl. minia- tis B. 2. <i>lantana</i> R. 2.
F. ♂ †	c.	3. - - - amer. urticæ fol. fl. primo luteo deinde purpureo.
A. ♂	a.	4. - - - fol. cordato fl. albo R. 1.
P. Ω	a.	1. Virga aurea, altissima paniculis nonnun- quam reflexis B. 5.
P. ♂	a.	2. - - - omnium minima B. 14. 3. Virga

Habitus

Culture

P. Ω

a.

3. Virga aurea mexicana Limoni folio B. 11.
solidago R. 1.

P. Ω

a.

4. - - - montana latiore fol. glabro
B. 2. *solidago* R. 4.

P. Ω†

a.

5. - - - angusti fol. panicula speciosa
B. 6.

P. Ω†

a.

6. - - - minus fol. lato ferrato.

P. Ω

a.

7. - - - fol. lato dentato caule pur-
purascente.

P. ♂

b.

Viola frutescens B. 9. R. 1.

A. ≡

c.

1. Vitex fl. purpureis B. & R. 1.

A ≡

c.

2. - - - seu agnus castus fl. albo B. 3.

A. ♂

c.

1. Vitis idea afr. fol. rotundo ferrato, *myrtus*
afr. fl. rubro, *Myrsine* L.

V. ♂

a.

2. - - - quinquifolio Canadensis B. 11. R. 3.
Hedera L. 2.

V. ♂

a.

3. - - - fol. apii B. 6. R. 2. L. 6.

V. ♂

a.

4. - - - vinifera virginiana L. 3.

F.

f.o.

Volkameria spinis petiolorum rudimentis L. 1.

P.

b.

1. Yucca fol. aloës, B. *Cordyline* R. 3. L. 1.

A.

c.

2. - - - fol. aloës margine crenulato L. 2.
aloë B. 11. *Cordyline* R. 1.

R.

I

f.o. x ff.

Zinziber angustiori fol. amomum R. 1.

*On trouve aussi chez le meme une Collection
tres grande de semences a fleurs ou des
plantes annuelles , des quelles on trouve
aussi le Catalogue , étant le Cent especes
5. florins d'hollande.*

**Comme aussi Racines des asperges des meilleurs
especes.** fl. fols.

d'Une année, le Centaine 1 - 5

De deux années le Centaine 1 - 10

**Et d'aillieurs le plus exquis es sortes de vignes,
suivantes.**

Blanches, Vander Laan. - - - 1 - 10

Vosholse. - - - 2 - 10

Diamant. - - - 1 - 10

Parel druyf. - - - 1 - 10

Geel rand, ou raamborger. 1 - 10

Bleues Franquendaler. - - - 1 -

Catalonier. - - - 1 - 10

Et quelques autres.

VER-

VERKLARING

Der Letteren en Teken en staande op de eerste Colonne, te kennen gevende de boedanigheden der gewassen.

Betekenende. A. Boomagtige gewassen.
 F. Heesteragtige of struëlagtige;
 / . Klimmende.
 P. Planten.
 B. Bollen of Bolagtige.
 R. Wortelagtige Gewassen, des Winters al hun gewas verliezende.

De Teken en der Dieren-riem geven ten naasten by te kennen den tyd in welke zy bloeijen.

Zo betekent \approx Dat zy bloeijen, omtrent January.

X	—	—	—	—	February.
v	—	—	—	—	Maart.
8	—	—	—	—	April.
II	—	—	—	—	Mey.
6	—	—	—	—	Junio.
Ω	—	—	—	—	Julio.
W	—	—	—	—	Augustus.
⌒	—	—	—	—	September.
m	—	—	—	—	October.
→	—	—	—	—	November.
vp	—	—	—	—	December.

Ω → — van Junio tot November, enz.

8 Doet kennen die gewassen, die 't grootste gedeelte der Zomer Bloemen dragen, of wel 't gehele jaar door nu en dan bloem geven.

† Betekent Gewassen, welke fraije en sierlyke Bloemen geven.

VER-

VERKLARINGE

Der Letteren en Teken en der tweede Colomme te kennen gevende op hoedanige wyze behandelt, en 's winters bewaard werden kunnen.

- a. Geeft te kennen die gewassen welke zonder enige dekkinge onze winter koude verduuren en in vollen grond overblyven.
- b. - - - - de zulke die in de koude grond overblyven, dog des Winters, met stro, matten, of droge boom bladeren moeten gedekt werden.
- c. - - - - die gene die in een ordinair Orange huys, kamer of ander vertrek kunnen werden bewaard, alleen maar zorg dragende dat niet bevroren.
- d. - - - - die ingelyks in een bovengemeld vertrek kunnen overwinteren, dog dicht voor de glazen moeten werden gestelt, of op een plaats daar de zon en versse lugt genieten kunnen.
- e. - - - - die in een kas in welke des winters een weinig gestookt werd, moeten werden bewaard.
- f. - - - - die in een kas gehouden, en gelyke warmte als de Annanassen genieten moeten.
- g. - - - - die gene die wel de grootste warmte vereisen.
- o. - - - - die 't gehele jaar binnen de bakken of kassen eisen gehouden te werden, also ons Climat niet verdragen.
- x. - - - - die in het voorjaar op den broeybak moeten gestelt en aan den groey gebragt werden.
- i. - - - - die des winters zeer weinig water moeten gegeven werden.
- ii. - - - - dezulke welke in 't geheel des winters geen water behoeven te ontfangen.
- *. - - - - africaanse bollen of planten, welke in den vollen gront geplant, en des winters met glasramen gedekt zynde en voor alle vorst bewaard werdende, veel gewilliger bloeijen als dat dezelve in potten geplant, en des winters in 't Oranje huys bewaard werden.